Processus Integri

IN

MORBIS

Ferè omnibus

CURANDIS,

A.D°. *Thoma Sydenham*, M.D.

Conscripti.

Quibus accessit graphica Symptomatum delineatio.

LONDINI:

Impensis *Sam. Smith*, & *Benj. Walford*, ad Insignia Principis, & *Ja. Knapton*, ad Insigne Coronæ in Cœmeterio D. Pauli. 1693.

1168. b 12

Tractatus, (cui Titulus, *Processus Integri in Morbis ferè omnibus curandis*) à Clarissimo D. D. Thomâ Sydenham Conscriptus Imprimatur.

Thomas Burwell, Præses.

Humphrey Brook,
Jos. Clerk,
Guilielmus Briggs,
Fr. Slare,
} Censores.

Datum 18°. Die *Augusti* A. D. 1693. in Comitiis Censoriis ex Ædibus Collegii nostri.

Tho. Basset, Warden.

Processus Integri

IN

MORBIS

Ferè omnibus

CURANDIS,

A.D°. *Thoma Sydenham*, M.D.

Conscripti.

Quibus accessit graphica Symptomatum delineatio.

LONDINI:

Impensis *Sam. Smith*, & *Benj. Walford*, ad Insignia Principis, & *Ja. Knapton*, ad Insigne Coronæ in Cœmeterio D. Pauli. 1693.

MVSEVM
BRITAN
NICVM

456

Amice Lector.

SPecimen habes Praxeos eximiæ, in dilectissimi filii M. D. usum, caute & diligenter excogitatum, suâ ipsius manu conscriptum, mihi autem pro familiaritate ista quâ omnes excepit, concessum a *Cl. Sydenham*, Viro sanè cui vix ætas superior parem dederat, vel postera datura est, non modo in arte sua mirâ sagacitate, & ingenii acumine singulari, conspicuo; sed & probis moribus, & in humanum genus, studio & amore insignibus adeo, ut apud omnes summum sui reliquerit desiderium: Cujus præcepta licèt animo meo & imo pectore infixa sint, ne tamen fortè fortunâ in mei ipsius & ægrorum detrimentum excidant memoriâ parùm fidâ, typis haud ita pridem mandabam, exemplaribus circiter viginti impressis, ut amicis quoque inservirem. Nescio autem quo pacto in lucem irrepsit publicam inter *Miscellanea Curiosa* superioris anni Norimbergæ editum; sed ineptâ mole inutile. Prodiit tandem eo modo vestitum ut tibi sit in quovis loco paratum; figmentis cerebri vanis

& futilibus sciolorum dogmatis nequaquam refertum, nec hypothesi placidè solidis ut videtur rationum momentis undequaque constipatâ superbiens; humile autem & modestum accuratè morbos depingit, & accuratiùs adhuc medetur; in id solum sollicitum ut innoteſcat quod natura faciat aut ferat. Et si verum loqui liceat, modo partium situs noveris, pateant tibi per Symptomata ægritudines, (quod assiduâ ediscas observatione) scias deinde veram & genuinam medendi methodum per diætam & Pharmaciam adhibere, fæliciſſimus eris practicus, & tibi & infirmis optimè consules. Parùm interim tuâ refert utrum Alcali peccet an Acidum, num in Spiritibus Animalibus, an in ipso sanguine, aut in recondito aliquo Viscere deliteſcat morbi minera; unde de Periodico Intermittentium reditu doctè satis & prolixè possis disserere; dum interea ipsa Febris sine ullis ambagibus, inquietudine, siti, calore, pulsu celeri, nauseâ, cæteriſque Symptomatis, etiam astantibus palam est, & apertè dignoſcitur: Hinc sæpius mirari subit, quamobrem anxiè in & scrupulosè immediatas & proximas morborum causas, dum Medicinam pertractandam suscipiunt, indagare satagunt, & è tenebris istis, quibus natura obduxit, irrito licèt conatu, erucre, gravi & subacto judicio viri, & in praxi versatiſſimi; satis interim gnari se latere vel

quævis

quævis obvia; unde enim dimanat graminis viridis, aut albus nivis color? Quid est quod humana anima ratiocinari nequeat dum adhuc Infantes aut Pueri sumus? Unde forma tua Specifica? Satius esset Medicum quam Philosophum agere, (quis enim unquam Cartesium sibi Medicum voluerit:) minutissima Phænomena planè & ritè enumerare, & remedia quibus unusquisque morbus facilius cedat, candido & sincero animo proponere; ita tandem limites suos prætergressa, quibus angustis nimis jam includitur; ars nobilissima, omnibus, quaquaversum patet orbis, fæliciter satis & prosperè salutem, filiis autem suis honores summos conciliabit.

Quid in Febribus, Variolis, Morbillis, acutis cæteris, ut & Chronicis sanandis valuit optimè meritus autor noster, sequentes indicant paginæ. Regimen & Dieta instituuntur aptissima; præscribuntur remedia pauca, sed necessaria; nec in Pharmacopolarum lucrum excogitata, nec inani ostentationi composita: sitibundis ægris (eodem modo quo & ipse sitim suam restinguere solitus erat) cerevisiam tenuem affatim & pro libitu hauriendam, unde mirè reficiuntur & refrigerantur, concedit; nec immanitate plus quàm barbarâ, precibus eorum surdus, Apozemata & Julapia præ ingrato sapore fastidita substituit; maximam adhibet cautelam ne exæstuans nimis, vel igne luculentiori, vel stra-

gulorum onere, plus adhuc incaleſceret, vel à propinatis forſan remediis eum in finem ut per poros eliminetur materia morbifica cruda adhuc & inconcocta, quæ tamen hâc datâ ansâ concitato motu cerebrum petit, unde Phreneſis aut Coma, aut extravaſato ſanguine deturpant cutim maculæ purpureæ, aut eruptiones quas vocant miliares collum & pectus ubivis obſident. Nunquid ad amuſſim magis depingi poterat quam Variolarum hiſtoria? eruptionis diem in utravis ſpecie deſignat, puſtularum ingenium ad unguem deſcribit, quo tempore incipiat, & quamdiu continuetur Salivatio, quo iterum faciei manuumque tumor ſe prodat, quid tandem quolibet die expectandum diſertè explicat. Paregoricorum uſum, quo emolumento judicent Practici, primus perſuaſit, malum, ingerendi Cardiaca ante eruptionem, morem, unde ſæpe accerſitum fuerit confluentium genus, meritò primus improbavit. Meliùs autem hæc ex ipſo fonte. Valeas itaque amice Lector, & ſicubi ſcateant Mendæ ignoſcas.

S. M.

ORbe diviſo, vacuâque vix dum
Urbe deceſſit furibunda Peſtis;
Strage non noſtrâ ſatiata, verùm
Strata ruinâ:

Fœta quin Lethi variante larvâ
Febris exarſit, face nunc citatâ
Torret exundans, itidemque lentâ
Tecta favillâ.

Virginum caſtos temeraſſe vultus
Hanc juvat, putri ſcelerata tabo
Pollui vivas; tenet una formas
Mille nocendi.

Horruit Diram Medicina Phœbo
Quæſta: qui tandem, cape mutuatas,
Tumuat [illegible]
[illegible]
Tela, ſagittas.

Febris irato tremefacta lætas
Deſerit Terras, fugit ecce Dextram
Oſa vitalem! Stygiâque frendet
Merſa Palude.

Fata,

Fata, ſed nullâ fugienda ſorte,
Invident etſi tibi Sydenhamum:
Poſthumus floret, rediviva lætis
En levat ora.

Mente, non Lethe violandus ipsâ,
Vivit in grata, pia vel ſub Umbris
Cura vivum nunc tua præbet, in te
Ipſe revixit.

Amico Integerrimo, Medico Expertiſſimo *S. M.* ob iteratam hujus eximiæ Praxeos Editionem, gratulabundus hæc vovet,

Chriſtophorus Crelle, M. D.

Index

Index Rerum.

A.

De Abortu Præcavendo 58
Ambustis 85
Angina 26
Apoplexia 40
Asthmate 90

C.

Canis rabidi morsu 89
Chlorosi 81
Cholera Morbo 50
Chorea Sancti Viti 38
Colica biliosa 48
Colica hysterica 55
Colica Pictonum 52
Contusionibus 87

D.

Diabete 72
Diarrhœa 45
Dysenteria *Ibid.*

E.

Epilepsia puerorum 75

F.

Febre Stationaria 15
Febre Constitutionum variarum 13
Febribus à Dentitione ortis 78
Febre depuratoria 10
Febre Erysipelatosa 23
Febre Infantum 17
Febre Hectica Infantum 79
Febre Intermittenti 13
Febre Pestilentiali 11
Febre Scarlatina 17
Fluore albo 71
Furfure sive porrigine capitis 88

G.

Gonorrhœa virulenta 65

H.

H.

Hæmoptöe 83
Hæmorrhagia narium 79
Hæmorrhoidum dolore 73
Hæmorrhoidum fluxu immodico 74
Hydrope 60
Hypochondriaca affectione 5
Hysterica passione. *ibid.*

I.

Ictero 57
Iliaca passione 52

L.

Lochiorum fluxu immodico. 58
Lochiorum suppressione 59
Lue Venerea 68

M.

Mania communi. 86
Mensium fluxu immodico 53
Mensium suppressione 82
Morbillis 27

N.

Nephritico Paroxysmo 44

O.

Ophthalmia 43

P.

Paralysi 91
Peripneumonia notha 20
Phthisi 92
Pleuritide 18
Pruritu ferino 24
Punctura tendinis 83

R.

Rachitide vera 76
Rheumatismo 21
Remediorum formulæ 1

S.

Scorbuto 95

T.

Tenesmo 45
Tussi 92

V.

Variolis 30
Ulcere Veficæ 87
Vomitu Sanguinis 83
Uteri procidentia 44

Medica-

Medicamentorum quædam formulæ in praxi magis familiares.

Potio Communis Purgativa.

℞ *Tamarind.* ʒß, *fol. Sennæ* ʒij, *Rhei.* ʒiß, *coq. ſ. q. aq. ad* ʒiij, *in Colatura diſſolve Mannæ & Syrup. Roſar. ſolut. an.* ʒj, *m. f. Potio.*

Emeticum Commune.

℞ *Aq. Cardui Benedict.* ʒij, *Infuſ. Croc. Metall.* ʒj, *Syr. Caryophyll.* ʒß, *m. f. vomitorium.* Sumat horâ 4ª. Pomeridianâ, ſuperbibendo poſt ſingulas vomitiones hauſtum largum liquoris poſſetici.

Julapium Perlatum.

℞ *Aq Ceraſor. nigr. lact. Alexeter. aa.* ʒiij, *aq. Cinnamom. hordeat.* ʒj, *Margarit. præparat.* ʒiß, *ſacchar. Cryſtall. q. ſ. adde aq. Roſar.*

Damascen, ʒß, *f.* *Julap.* de quo cap. cochlear. *iv.* vel *v*, in Languoribus.

Julapium Cardiacum.

℞ *Aq. Lact. Alexeter. Cerasor. nigr. an.* ℥iij, *aq. Epidem. Syr. Caryophyll. & de succo Citri, an.* ℥ß, *m. f. Julap. de quo capiat sæpius.*

Decoctum Diæteticum.

℞ *Rad. Sarsæparill.* ℥vj, *lign. Sassafr. & Chinæ an.* ℥ij, *Glycyrrhiz.* ℥j, *coq. in aq. font. Congiis* ij, *per horæ dimidium; deinde stent clausè super cineres calidos per horas* xij, *postea ebulliant ad tertiæ partis consumptionem; Cum primùm ab igne amoveatur, infunde sem. Anisi* ℥ß, *post duas horas coletur, & postea depuretur per residentiam, & liquor reponatur lagenis vitreis probè clausis ad usum.* Sit pro potu ordinario per *xxx*, dies.

Apozema Aperiens & Antiscorbuticum.

℞ *Rad. gramin. Cichor. Fænicul. & Asparag. an.* ℥j, *uvarum Corinthiac. & passul. enucleat. an.* ℥ij, *fol. hepat. ling. cerv. & cap. Ven. an.* M. j, *fol. Beccabung. sub finem addit.* M. ij, *coq. s. q. aq. fontan, ad* ℔ij, *sub finem adde vini Rhenani* ℔ß. *Colaturâ adhuc calente, infunde ad duas horas, vase clauso, Cochl. hortens.*

hortenſ. M. j, *colatur. adde ſyr. è quinq; radic & è ſucco Aurant. an.* ʒij, *aq. Cinnamom. hordeat.* ʒj, *M. f. Apozema.* Sumat ℔ß, manè & 5ª pomeridianâ per *xiv*, dies.

Eclegma Incraſſans in Tuſſi.

℞ *Ol. Amygd. dulc.* ʒj, *Syr. Papav. Rhœad. Portulac. Jujub. & Lohoc ſani, an* ʒß, *Sacchar. cryſtall. q.ſ. M. in mortario marmoreo ad integræ horæ ſpatium, & f. Linctus perfectè miſtus; recondatur in olla figulina, ad uſum.* Cap. ſæpius lambend. è baculo Liquiritiæ.

Eclegma fortiùs incraſſans.

℞ *Conſerv. Roſ. rub. Syr. violar. & de Mecon. an.* ʒj, *ſem. papav. alb.* ʒiij, *contundantur ſimul & per ſetaceum trajiciantur, deindè adde ol. nuc. moſchat. expreſſ. gr.* vj, *f. Eclegma.*

In Defluxione tenui.

℞ *Conſerv. roſar. rub.* ʒij, *Syr. de Mecon. & jujub. an.* ʒj, *Oliban. Maſtich. & Succin. an.* ʒj, *ol. nuc. Moſchat per expreſſionem gr.* vj, *M. f. Lohoch.* de quo lambat ſæpè; bis in die cap. eclegm. deſcript. cochl. j, inſtilland. Balſam. Sulphur. Aniſat. à gut. *viij*, ad gut. *xij*.

Cereviſia Purgativa.

℞ *Polypod. Querc.* ℔j, *Rad. Rhabarb. Monach. fol. ſennæ & paſſul. enucleat. an.* ℔ß, *Rhabarb. inciſ. & rad. Raphan. Ruſtican. an.* ʒiij, *fol. Cochl. hortenſ. ſalv. an. M. iv. Aurantior. inciſ. N° iv, infunde in Congiis v, vel vj, Cereviſiæ non lupulatæ fermentationis tempore, & quando ad maturitatem pervenerit*, ſit pro potu ordinario per dies *xiv*, vel *xxj*, præcipuè verò ſumat hauſtum ſingulis Auroris.

Emplaſtrum Hyſtericum.

℞ *Galbani in tinctura Caſtor. ſolut. & colat.* ʒiij, *Tacamahac.* ʒij, *f. Emplaſt. pro umbilico.*

Catharticum pro Infantibus tenellis.

℞ *Syrup. Cichor. cum Rhabarb. Cochl.* j, *parvulum.*

Decoctum Amarum Purgativum.

℞ *Decoct. amar. duplicatâ ſenâ* ʒiv, *Syrup. de Spina Cervina* ʒj. *Elect. de Succ. Roſar.* ʒij, *M. f. Potio.*

De

De affectione, in fœminis, hysterica; maribus, hypochondriacâ dicta.

CUM à caſu aliquo graviori moleſtum patitur humana anima, ataxiam concipiunt animales ſpiritus; urina ſubinde limpidiſſima copiosè excernitur; ſanitatis recuperandæ ſpes omnis protinus abjicitur, & triſtiſſima quævis ſibi ominantur ægrotæ; quamcunque corporis partem morbus inſederit (plurimas autem inſidet) ſymptomata ei parti competentia confeſtim urgent; in capite apoplexia, hemiplegiâ ſoluta, ſtatim à partu adoritur; ſpaſmi epilepſiæ perſimiles (vulgò uteri ſtrangulatus, in quo venter & præcordia guttur verſùs intumeſcunt) infeſtant; clavus hyſtericus, in quo dolor in capite atrociſſimus, quem tranſverſo pollice poſſis contegere, ægrâ interim materiam viridem bili porraceæ parem evomente, miſerè excruciat; cordis palpitationem, tuſſim, paſſiones iliacam & colicam, nephritin, urinæ ſuppreſſionem æmulatur paroxyſ-

roxyſmus; vomitiones enormes, diarrhœam ſubinde excitat; externè in carne muſculoſa nunc dolorem nunc tumorem inducit, in tibiis hydropis inſtar; nec (quod mireris) intactos dimittit dentes; dolor dorſi crebèrrimè ſævit; & ſæpe ſæpius adeò refrigerantur externæ partes, ut cadaver planè referant; in riſum & lachrymas effuſiſſimas ſine ulla προφάσει ridiculè erumpunt; ptyaliſmus nonnunquam eo gradu laborantes afficit, ut Mercurio delibutas facilè crederes Dolores hyſterici, quamcunq; partem obſident; ubi diſceſſerint, teneritudinem, quæ tangi recuſat, relinquunt, ac ſi verberatæ fuiſſent carnes.

Mittatur Sanguis ad ℥viij.

Emplaſt. de Galbano umbilico admoveatur. Sequenti manè aggrediatur uſum ſequentium pilularum;

℞ *Pil. Coch. maj.* ℥ij, *Caſtor. pulv. gr.* ij, *Balſam. Peruv. gutt.* iij, *f. Pil. xij*, Cap. *iv.* ſingulis vel alternis matutinis, pro ratione virium, horâ 4ª vel 5ª matutinâ, ſuperdormiendo.

℞ *Aq. Rutæ* ℥iv, *Bryon. comp.* ℥ij, *Caſtor. modulo ligat. & in vitro ſuſpenſ.* ℥ß, *Sacchar. Cryſtall. q. ſ.* de quo capiat cochl. *iv*, vel *v*, in omni languore. Poſt has pilulas ſumptas utatur ſequentibus;

℞

℞ *Limatur. Chalyb. gr. viij, cum ſ. q. Extract. Abſinth. ſ. Pil. N° iij.* Sumat ſummo manè, & repetantur horâ 5ª pomeridianâ per *xxx* dies, ſuperbibendo hauſtum Vini Abſinthitis.

Sin forma boli magis arrideat.

℞ *Conſerv. Abſinth. Roman. & Conſerv. flaved. Aurant. an.* ℥j, *Angelic. condit. Nuc. Moſchat. condit. & Theriac. Andromach. an.* ℥ſs, *pulv. Ari comp.* ʒiij, *Zinzib. condit.* ʒij, *cum ſ. q. Syrup. de ſucc. citr. vel, ejus defectu, Syr. Aurantior. ſ. Electuarium.*

℞ *Elect. præſcript.* ʒij, *limatur. Chalyb. gr. viij, cum ſ. q. Syrup. Aurantior. ſ. Bolus* ſumendus manè & ſerò, ſuperbibendo hauſtum vini abſinthitis, vel Cochl. vj ſeq. Infuſionis.

℞ *Rad. Angelic. Enul. campan. & Imperator. an.* ℥j, *fol. Abſinth. vulg. Centaur. min. Marrub. alb. & Chamædr. an. M.* j, *Cort. Aurant. duor. inciſ. affunde vini Hiſpanic. q ſ. ad ſupereminentiam duorum digitorum.* Coletur tempore uſus. Vel,

In Delicatulis *Chalybs* exhiberi poterit in forma pulv. ſequentis ;

℞ *Limatur. Chalyb. probè trit,* ʒj, *pulv. Ari comp.* ʒvj, *ſem. Coriand. præparat. Aniſi, Fœnicul. dulc. an.* ʒſs, *Cinnamom. acutiſſ. Corall. rubr. præparat. an.* ʒiij, *Nuc. Moſchat.* ʒij, *f. omnium pulvis ſubtiliſſimus, cui adde ſacchar. albiſſ. ad pondus omnium,* hujus cap. è Cochleari ʒſs, bis in die per 4 dies, tum ʒj, bis in die per 40 dies, ſuperbibend. Cochl. vj, ſeq. Julap. vel Vini Abſinthitis.

℞ *Aq. Lact. Alexeter.* ʒxij, *Gentian. comp.* ʒiv, *Abſinth. magis comp.* ʒij, *ſacchar. albiſſ. q. ſ. f. Julap.* Vel;

℞ *Vini Rhenan. Abſinth.* ℥ſs, *aq. Gentian. comp.* ʒij. *Syr. Caryophyll.* ʒj, *f. Julap.*

℞ *Myrrh. elect. Galban. & Aſæ fœtidæ, an.* ʒj, *Caſtor.* ʒſs, *cum ſ. q. Balſam. Peruv. f. Pil. è ſingulis drachmis xij.* Sumat *iij*, ſingulis noctibus, ſuperbibend. aq. Bryon. compoſ. Cochl. *iij*, vel *iv*, per totum decurſum hujus proceſſûs.

Si Pilulæ Præſcriptæ ventrem moverint, utatur ſequentibus;

℞ *Caſtor.* ʒj, *ſal. ſuccin. volatil.* ʒſs, *cum ſ. q. extract. Rutæ, f. pilulæ* N° *xxiv*, Cap. *iij*, ſingulis noctibus, ſuperbibendo Julapii hyſteric. Cochl. *iij*, vel *iv*.

Sp.

Sp. C. C. ad gutt. *xvj*, vel *xviij*, in aqua aliqua appropriata ſæpius exhibitus valde confert.

Si verò his non cedat remediis, tum capiat ſequentes pilulas;

℞ *Trochiſc. de Myrrh. pulv.* ℈j, *Balſam. ſulphur. Terebinth. gut. iv, cum ſ. q. gumm. Ammoniac. ſolut. f. Pil.* N° *iv.* Cap. manè & ſerò ſuperbib. Julap. hyſteric. Cochl. *iv*, vel *v*, inſtillando Sp. C. C. gutt. *xij*.

Electuarium Antiſcorbutic. cum aqua ibidem deſcripta prodeſt in his affectionibus, ut & *Electuar. corroborans cum additione Conſerv. Cochl. hortenſ.* ℥j, *pulv. Ari Compoſ.* ℥vj, ſuperbibendo præſcriptam aquam.

At ſi affectus his non cedat remediis, eundum eſt ad *aquas ferreas*; & ſi neq; his, tum ad *Sulphureas*, quales ſunt *Bathonienſes*.

Inter bibendum aquas ferreas hæc obſervanda; ſi aliquod Symptoma gravius acciderit, quod potationi aquarum referri poteſt, tunc ab iis æger abſtineat, donec Symptoma iſtud penitus evanuerit. Æger in earum uſu per ſex ſeptimanas ad minimum, vel potius ad duos menſes perſeveret. *Zinziber conditum*, vel *Semina Carui Saccharata*, ad calefaciendum ventriculum ſubinde ſumat. *Pilulæ* etiam *hyſtericæ iij*, devorari poſſunt per primas *x*, noctes, ſuperbibendo *Julap. hyſteric.*, cochl. *iv*, vel *v*.

Quoad uſum *aquarum Bathonienſium*, duobus diebus bibat eas, ac tertio die per modum Balnei eas ingrediatur, atq; ita alternatim per ſex ſeptimanas vel duos menſes.

Si *Chalybs* juſto plus corpus calefaciat, tum per ejus uſum, 4ª quâq; Aurorâ ſumat *aq. mineralium purgantium* ℔iv. Quæ tametſi alvum moveant, haud tamen tumultum cient, ut ſolent Cathartica ex officinis deprompta.

De Febre Depuratoria annorum 1661, 62, 63, 64.

Si æger juvenis ſit, extrahatur ſanguis è brachio, & eodem die poſt aliquot horas, vel ſequenti die duabus horis poſt leve prandium, *Emeticum ex infuſ. Croc. Metall.* exhibeatur; & poſt finitam operationem Emetici, hoc vel ſimile paregoricum.

℞ *Aq. Ceraſor. nigr.* ℥ij*ſs*, *aq. Epidem.* ℥ß, *Laudan. Liquid. gutt. xvj*, *Syr. Caryophyll.* ʒij, *M. f. Hauſtus.*

Poſt hunc diem uſq; ad undecimum vel duodecimum ſingulis Auroris injiciatur enemas ſequens;

℞ *Decoct. commun. pro Clyſtere* ℔j. *(vel lactis vaccini eandem quantitatem) Sacchar. Culinar. & Syrup. violac. an.* ℥ij, *f. Enema.*

Poſt

Poſt dictum diem alvus conſtipari permittatur, quò materia febrilis citiùs concoquatur, ad quem etiam finem Cardiaca moderata his ultimis diebus exhibita apprimè conducunt; ut,

℞ *Pulv. è Chel. Cancror. comp. gr. xiv, Elect. de Ovo* ℈ß, *cum ſ. q. Syr. Caryophyll. f. Bolus* ſumendus octavâ quâq; horâ, ſuperbibendo ſequentis Julapii Cochl. *v*, vel *vj*.

℞ *Aq. lact. Alexeter. Ceraſor. nigr. an.* ℥iij, *Aq. Epidem. & Syr. Caryophyll. an.* ℥j, *M. f. Julap.* vel alia his ſimilia.

Hac methodo ſollicitè obſervatâ, uſitatò circa *xv* diem (tum ex laudabili in urina ſeparatione, tum ex manifeſta Symptomatum omnium remiſſione) tempeſtivum eſſe Potionem Purgantem communem exhibere percipies.

De Febre Peſtilentiali 1665, 66.

Poſt venæ ſectionem in lecto celebrandam, æger ſtragulis obruatur, & Lacinia Lanea ſincipiti alligetur; tum, ſi vomitus non adſit, hoc vel ſimile Hydroticum exhibe.

℞ *Theriac. Andromach.* ℥ß, *Elect. de ov.* ℈j, *pulv. è chel. Cancr. comp. gr. xij, Coccinel. gr. viij, Croc. gr. iv, cum ſ. q. ſucc. kermes, f. Bolus,*

Bolus, quem ſumat ſextâ quâq; horâ, ſuperbibendo Cochl. *vj*, ſeq. Julapii.

℞ *Aq. Card. Benedict. & Scord. compoſ. an.* ℥*iv*, *aq. Theriacal. ſtillatit.* ℥*ij*, *Syr. Caryophyll.* ℥*j*, *M. f. Julapium.*

Si adſit vomitio, hydroticum differatur, donec ſolo tegumentorum pondere ſudor promanare incipiat, linteaminis parte vultui ſuperinductâ.

Incepta Diaphoreſis hauſtulis Zythogalæ ſalviâ alteratæ, vel Cereviſiæ cui macis aliquantulum incoxeris ſubinde repetitis ad naturalis diei ſpacium (i. e. horas 24.) eſt continuanda; in ſudore licet juſculis confortativis ægrum reficere.

Ubi tumor enatus fuerit, venam aperire non ſuſtinui; per horas adhuc à finito ſudore *xxiv*, ægro ſe in lecto continente frigus cautè devitetur. Induſium ſponte ſuâ in corpore areſcere permittatur, potulenta omnia calidiuſculè hauriantur, & Zythogalæ ſalviâ alteratæ uſus etiamnum continuetur, in ſeq. luce potio purgat. communis exhibeatur.

Anni 1667, 1668, Febrim Varioloſam & Variolas produxerunt.

Anni 1669, 70, 71, 72, Febrim Dyſentericam.

Anni 1673, 74, 75, Febrim Comatoſam.

Cu-

Curationem febrium horum annorum non attingo; quoniam methodo in febre anni 1685, &c. descriptâ curari eas potuisse autumo.

De febribus intermittentibus.

Cum rigore & horrore adoritur paroxysmus, quibus mox succedit calor, & huic tandem sudor, & subsequens ἀπυρεξία: licèt in primis morbi diebus, Autumno maximè, aliquoties remissio potius quàm intermissio persentiscitur, in calore æq; ac in rigore vomiturit ut plurimum ac vehementer ægrotat miser cum siti & lingua arida. In tenera ætate abdominis inflatio, in adultis crurum tumor febris solutionem; tonsillarum dolor, raucedo, oculi cavi, facies Hippocratica, mortem denunciant.

℞ *Cort. Peruv. subtiliss. pulv.* ʒj, *cum s. q. Syr. Caryophyll. vel de Rosis siccis, f. Electuarium dividendum in xij, doses*; quarum unam capiat 4ª quâq; horâ, superbibendo Vini cujuslibet haustum, incipiend. immediatè post paroxysmum.

Si autem præscripti boli ventrem moverint, in haustu Vini dentur *gutt. x, Laudan. Liquid.* singulis vel alternis vicibus post assumptionem boli, ut opus fuerit.

Ad

Ad recidivam præcavendam (præcipuè in Quartana) repetatur proceſſus prædictus ſingulis ſeptimanis per tres alias vices.

Sin forma Pilularum magis arrideat,

℞ *Cort. Peruv. pulv.* ʒj, *cum ſ. q. Syr. Caryophyll. f. Pilulæ mediocris magnitudinis*, quarum capiat *vj*, quartâ quâq; horâ.

℞ *Cort. Peruv. pulv.* ʒij, *Vin. Rhenan.* ℔ij, *ſtent ſimul in Infuſione frigida, & coletur per manicam* Hippocratis. Uſus tempore cap. ʒiij, tertiâ vel 4ª quâq; horâ.

Altera Methodus curandi Tertianas.

℞ *Serpentar Virgin. ſubtiliſſ. pulveriſat. gr. xv, Vin. alb.* ʒiij. Sumat duabus horis ante Paroxyſmum, & ſtragulis coopertus æger ſudet per *iij*, vel *iv*, horas, idem faciendo per duas alias vices ante Paroxyſmum.

Pro Infantibus febre intermittente laborantibus.

℞ *Aq. ceraſor. nigr. & Vini Rhenan. an.* ʒij, *Cort. Peruv. ſubtiliſſ. pulv.* ʒiij, *Syr. Caryophyll.* ʒj, *M. f. Julap.* Cap. Cochl. j, alterúmve, pro ratione ætatis, 4ª quâq; horâ, donec Paroxyſmi non amplius diſcrucient, inſtillando alternis vicibus, ſi Diarrhœa adfuerit; Laud. Liquid. gutt. *j*, vel *ij*.

De

De febre Stationaria, ab an. 1685 *ad* 90.

Calor & frigus ſe invicem excipiunt, artus pariter & caput dolent, pulſus interim ferè ſanus, nonnunquam tuſſis, dolor circa collum & fauces, exacerbatio febris prope noctem, inquietudo, ſitis, lingua vel humida & ex omni parte pelliculâ albâ & ſcabrâ veſtita, vel ſicca, fuſci coloris in medio, quam partem undiq; cingit fimbria inalbeſcens. A jugi in lecto decubitu coma & phreneſis, à calido regimine petechiæ, maculæ purpureæ, eruptiones (quas vocant) miliares morbillis magis rubentes, pulſus inordinatus, tendinum ſubſultus, atq; ita tandem mors. Sudores in initio ſymptomatici divexant, qui, ſi abarte provocentur, viſcoſi à capite erumpunt, & materiam morbificam in caput aut in artus transferunt.

Mittat. Sanguis ad ʒx, è brachio. Reiteretur Venæſectio; ſi modò reſpirationis difficultas, dolor capitis inter tuſſiendum lancinans, & alia ſigna Peripneumoniæ nothæ adſint. In hoc caſu tam venæſectio quàm Catharſis repetenda, donec æger convaluerit.

Veſperi applicetur Epiſpaſticum & ſequenti Aurorâ Potio Lenitiva præſcribatur, quæ ad tertiam vicem alternis diebus repetatur, & horâ ſomni poſt Catharſin hauſtus pacificus propinetur.

℞

℞ *Aq. Paralyſ.* ℥iij, *Syr. de Mecon.* ℥j, *Succ. Limon. recent. extract. Cochl.* ij, *M. f. Hauſtus.*

Aphthæ & ſingultus ſponteſuâ poſt curationem febris ſupervenientes ſponte evaneſcunt; Si in longum tempus decurrant, facilè fugantur *Cortic. Peruv.* ℥j, *cum Syr. Papav. Rhœad. q. ſ. in formam Electuar. vel pilular. redactâ*, ſuperbibend. hauſtum lactis deflorati. Remedium hoc certiſſimè ſcopum attinget, ſi non fruſtrentur ejus vires ex jugi ægri in lecto decubitu.

Diebus à purgatione liberis ſequentia præſcribantur.

℞ *Conſerv. Lujul. & Cynosbat, an.* ℥j, *conſerv. Berber.* ℥ß, *Crem. Tart.* ℥j, *cum ſ. q. Syr. de Limonib. f. Electuarium*, de quo cap. ad magnitud. Nuc. Moſchat. ter in die, ſuperbibendo ſequent. Julap. Cochl. *vj.*

℞ *Aq. Portulac. Lactuc. Paralyſ. an.* ℥iij, *Syr. de Limonib.* ℥jß, *Syr. Violar.* ℥j, *M. f. Julapium.*

Si febris ita ventriculum infeſtet, ut æger potionem retinere nequeat, *Pil. Coch. maj. ad* ℈ij, exhibeantur, tum etiam hypnoticum eſt concedendum, *v.* gr, *Laudan. Londin.* gr. jß, *cum ſimili quantitate Maſtich.* vel *Laudan. Liquid. gutt. xviij, in aq. Cinnamon. hordeat.* ℥j.

De-

Decoctum album ſit pro potu, ut & Cereviſia tenuis pro libitu.

De Infantibus febre Stationaria laborantibus.

Hirudines duæ utrinq; ponè aures applicentur, dein *Emplaſtr. Epiſpaſticum* cervici admoveatur.

Cereviſiâ, quâ Rhabarbarum fuerit infuſum, purgetur.

Si poſt Catharſin febris intermittere videatur, tum *Julapium cum Cortice Peruviano* (in Capite de febre intermittent: pro infantibus deſcriptum) exhibeatur.

De febre Scarlatina.

Æſtate exeunte, infantes præcipuè infeſtat. Rigent & horrent ſub initium; nec tamen admodùm ægrotant; cutis univerſa maculis parvis, rubris, crebrioribus, latioribus & magis rubentibus quàm in morbillis, interſtinguitur: Ad duos treſve dies perſiſtunt, quo quidem tempore evaneſcunt, & decedente ſubjectâ cuticulâ, ſquammulis furfuraceis, ad inſtar farinæ, cutis conſpergitur.

℞ C. C. *uſti, & pulv. è Chel. cancr. comp. an.* ʒß, *Coccinel. gr. ij, Sacchar. Cryſtal.* ʒj, *M.f. pulvis ſubtiliſſ. in xij, Chartulas dividend.* quarum unam Cap. 6ª quâq; horâ, ſuperbibendo cochl. *ij*, vel *iij*, ſequentis Julapii.

℞

℞ *Aq. Ceraſor. nigr. aq. Lactis Alexeter. an.* ʒiij, *Syr. è ſucc. citri* ʒj, *M. f. Julap.*

Applicetur etiam Epiſpaſticum cervici, & qualibet nocte *paregoricum ex Syr. de Mecon.* propinetur, & poſtquam ſymptomata ceſſaverint, purgetur æger.

De pleuritide.

Inter Ver & Æſtatem dominatur. A rigore & horrore orditur, quos ſtatim comitantur calor, ſitis, inquietudo & cætera febrium ſymptomata; elapſis pauculis horis, æger vehementi dolore punctorio in laterum alterutro circa coſtas corripitur, qui nunc versùs omoplatas, nunc ſpinam, nunc anteriora pectoris ſeſe propagat, tuſſi crebrâ excruciatur. Materia ſputo rejecta in initio morbi pauca eſt & tenuis, & ſæpe ſanguinis particulis intermiſta, progreſſu verò copioſior, & magis concocta, ſanguine etiam permixto. Febris pari paſſu incedit cum tuſſi, ſputo ſanguinis, dolore, & pro ratione liberioris expectorationis ſenſim imminuitur; nunc alvus eſt aſtricta, nunc ſoluta nimis. Eductus è vena ſanguis ſevi liquati ſpeciem præ ſe fert ubi refrixerit.

Mittatur ſanguis è brachio lateris affecti ad ʒx.

℞ *Aq. Papav. Rhœad.* ʒiv, *Sal. Prunel.* ʒj, *Syr. Violar.* ʒj. *M. f. Hauſtus*, ſumendus ſtatim à prima venæ ſectione.

℞ *Amygd. dulc. excorticat.* N° v, *ſem. Melon. Pepon. an.* ʒß, *ſem. Papav. alb.* ʒiij, *aq. hord.* ℔iß, *aq. Roſar.* ʒij, *cum ſ. q. ſacchar. cand. f. ſ. a. Emulſio*, Cap. ʒiv, 4ª quâq; horâ.

℞ *Decoct. Pectoral.* ℔ij, *Syr. Violar. & Cap. Ven. an.* ʒiß, *M. f. Apozema.* Cap. ℔ß, *ter in die.*

℞ *Ol. Amygd. dulc.* ʒij, *Syr. Violar. & Cap. Ven. an.* ʒj, *Sacchar. Cand. q. ſ. M. f. Eclegma*, de quo ſæpe lambat.

Oleum Amygd. dulc. per ſe, vel *Oleum Sem. Lini recenter extract*, exhiberi poteſt.

℞ *Ol. Amygd. dulc. Lilior. & unguent. Dialthææ, an.* ʒj, *M. f. Linimentum*, quo inungatur latus affectum manè & ſerò, ſuperimponendo fol. Braſſicæ.

Repetatur Venæſectio ad tres alias vices, ad eandem quantitatem, quatuor diebus continuis, ubi dolor & reſpirandi difficultas ſuadent.

De peripneumonia notha.

Ingruente hyeme & ſæpe ſub ejus exitum emergit, inſultu primo nunc incaleſcit nunc friget æger, ex motu quolibet vertiginoſus eſt, rubent & inflammantur genæ oculiq; tuſſit, & inter tuſſiendum dolor capitis lancinans premit, potulenta vomitu rejicit, urina turbida eſt & intensè rubet, ſanguis pleuriticorum æmulus, anhelus crebrò & celeriter ſpiritum ducit, dolente thorace. Ab aſthmate ſicco planè diſtinguitur, quòd in iſto nuſquam comparent febris indicia, in hac manifeſtò ſe produnt, licèt minora longè & magis obſcura quàm in peripneumonia vera.

Mittatur ſanguis è brachio dextro ad ℥x, Die ſequenti æger hanc potionem ſumat.

℞ *Caſſiæ extract.* ℥j, *Glycyr.* ʒij, *ficus pingues* N° *iv, fol. ſenn.* ʒijſs, *Agaric. trochiſcat.* ʒj, *coq. ſ. q. aquæ ad* ℥iv, *in Colatur. diſſolv. Mannæ* ℥j, *Syr. Roſar. ſolut.* ℥ſs.

Si verò potionem aſſumere nequeat, Cap. *Pil. coch. maj.* ʒij, horâ quartâ matutinâ.

Sequenti die celebretur iterum venæſectio, ad eandem quantitatem; ac poſtero die repetatur Catharſis, quæ porrò repetenda eſt alternis diebus, vel poſt majora intervalla, pro ratione virium; Atq; inſuper ſi Symptomata non ceſſaverint, extrahatur iterum ſanguis ſemel adhuc, bis, vel ſæpius, diebus aliquot inter-

interjectis, prout res poſtulaverit; ſed ut plurimum venæſectio bis celebrata ſufficiet. Interim, dum hæc fiunt, præſertim in diebus à purgatione vacuis, utatur *decocto Pectorali*, *Eclegmate* & *oleo Amygd.* dulcium, in Pleuritide deſcriptis.

De Rheumatiſmo.

Rigorem & horrorem & cætera febrium ſymptomata patiuntur, elapſo die uno alterove (eſt & ubi citius) dolor adeſt atrox nunc in hoc nunc in illo artu, in carpis, humeris & genubus præſertim, viciſſim hos relinquens & illos occupans, rubore & tumore in parte, quam poſtremùm affecit, adhuc reſiduis. Febris ſenſim evaneſcit, manente dolore, quin & nonnunquam immaniùs ſæviente. In lumbagine rheumatica immanis dolor adeſt, circa lumborum regionem fixus, nephritin mentiens, niſi quòd æger non vomituriat, qui procumbere nequit, ſed vel è lecto exilit, vel ſuper eodem erectus ſedet, corpore perpetuâ agitatione nunc versùs anteriora, nunc poſteriora inclinato. Sanguis pleuriticorum ſimilis.

Mittatur Sanguis è brachio lateris affecti, ad ℥x.

℞ *Aq. Nymph. Portulac. Lactuc. an.* ℥iv, *Syr. de Limonib.* ℥ſs, *Syr. Violac.* ℥j, *M. f. Julap.* de quo bibat ad libitum.

Præ-

Præſcribend. *Emulſio* 4. *Sem. frigid. maj. Cataplaſma è mica panis albiſſ. & lacte Croco tincto* applicetur parti dolenti.

Die ſequenti eadem ſanguinis quantitas detrahatur; atq; iterum, die uno vel altero interjecto, reiteretur, atq; porrò quater vel pluries, ſi opus fuerit, hoc obſervando, ut poſt ſecundam Venæſectionem majora ſint intervalla inter ſingulas ſanguinis miſſiones.

Diebus à Phlebotomia vacuis Enema è lacte ſaccharato ſubinde injiciatur, vel ſequens;

℞ *Decoct. commun. pro Clyſtere* ℔j, *Syr. Violar. & Sacchar. culinar. an.* ℥ij, *M. f. Enema.*

Si Imbecillitas ægri repetitionem Phlebotomiæ non ferat, tum poſt ſecundam vel tertiam venæſectionem Curatio hac methodo tentanda.

Capiat alternis diebus *potionem purgativam communem*, donec convaluerit, & iildem noctibus Paregoric. *ex Syr. de Mecon.*

Sin his remediis non cedat, & æger ob imbecillitatem evacuationes qualeſcunq; ferre nequeat, aggrediatur uſum *Elect. & aq. Antiſcorbutic.* in ſcorbuto deſcript. quæ etiam remedia locum habent in Rheumatiſmo Scorburico.

In Juvenibus, atq; iis qui temperatè vixerunt, vino non plus æquo dediti, Rheumatiſmus

tiſmus Diætâ ſimplici admodùm refrigerante, & mediocriter nutriente, æq; fœliciter, ac repetitis Venæſectionibus (quas minus ferre queant) profligari poteſt. Ex. grat.

Solo Lactis ſero ad dies quatuor veſcatur æger, poſtea præter ſerum pane ſimilagineo ſemel in die loco prandii, donec penitus convaleſcat; niſi quòd poſtremis diebus iterum panem in cœnam indulgere liceat. Symptomatis ceſſantibus, carnes pullorum elixorum, cæteraq; eupepta concedantur, tertio autem quoq; die ſolo lactis ſero victitet, donec tandem pancraticè valeat.

De febre eryſipelatoſa.

Nulla non corporis pars, præſertim facies, tumet, dolet & ſummè rubet, puſtulæ denſæ, parvæ, in veſiculas ſubinde faceſſunt, quæ per frontem caputq; ſerpunt, oculi tumore obruti, rigor & horror atq; reliqua febris indicia adſunt. In alia hujus morbi ſpecie, liquorum attenuantium potationi ſuperveniente, febricula adeſt, puſtulæ urticarum puncturas referentes, nonnunquam in veſiculas ſublatæ, mox recedentes, tuberculorum more ſub cute ſe condentes, maximè pruriunt, & ſcalpendo rurſum apparent. Eſt & alia eruptionis ſpecies, pectus ut plurimum obſidens, macula nimirum lata, cuti vix ſupereminens, porriginoſa, cum ſquammulis flavis,

qua

qua vigente, æger bene ſe habet, eâdem evaneſcente, leviter ægrotat, urina turbida & flava, iiſdem remediis, quibus pruritus ferinus, cedit, vino utatur æger & carnibus eupeptis.

Mittatur ſanguis è brachio ad ℥*ix*, vel *x*, Die ſequenti ſumat *potionem communem purgativam.*

℞ *Rad. Althææ & Lilior. an.* ℥*j*, *fol. Malv. Sambuc. Verbaſc. flor. Chamæmel. Melilot. ſummitat. Hyperic. & centaur. minor. an.* M *j*, *ſem. Lini*, *fænugræc. an.* ℥*ſs*, *coq. ſ. q. aq. ad* ℔*iij*, *Coletur liquor*, *& tempore uſûs adde ſingulis libris decocti Sp. Vini* ℥*ij*. Stuphæ è panno laneo huic decocto immerſæ, ac expreſſæ, calidè admoveantur bis in die, & pars affecta poſt fotum ſequenti mixturâ illinatur.

℞ *Sp. Vini* ℔*ſs*, *Theriac. Androm.* ℥*ij*, *pulv. piperis longi*, *& Caryophyll. an.* ℥*ij*, *f. mixtura*, quâ Charta Emporetica madefacta parti affectæ circumvolvatur.

Si primæ venæſectioni non cedat morbus, tum repetatur: & nondum ceſſante, ad duas alias vices celebretur, interpoſito ſemper die uno.

Diebus à Venæſectione liberis *Enema è lacte cum Syr. Violarum*, *Emulſio Refrigerans*, *& Julap. refrigerans*, ſunt præſcribenda.

De-

De pruritu ferino, & inveteratis cutis eruptionibus, quæ Venæsectioni & Catharsi non cedunt.

℞ *Theriac. Andromach.* ʒſs, *Elect. de ovo* ϑj, *rad. Serpentar. Virgin. ſubtiliſſ. pulver. gr. xv, Lapid. Bezoar. oriental. gr. v, cum ſ. q.* Syr. è *conditur. citri, f. Bolus,* horâ ſomni ſumendus per dies *xxj,* ſuperbibendo cochl. *vj,* ſequent. Julapii.

℞ *Aq. Card. Benedict.* ʒvj, *aq. Epidem. & Theriacal. Stillat. an.* ʒij, *Syrup. Caryophyll.* ʒj, *M. f. Julap.*

Singulis matutinis cap. liquoris poſſetici ℔ſs, calidè, & ſudet horæ unius ſpatio.

His finitis, ſi Puſtulæ adhuc non evanuerint, ſequenti Linimento partes affectæ inungantur.

℞ *Unguent. ex Oxylapatho* ʒij, *Unguent. Pomati* ʒj, *flor. Sulphur.* ʒiij, *ol. Rhodii* ϑſs, f. Linimentum.

Veruntamen Medicamenta præſcripta haud uſurpentur, niſi Venæſectione & Catharſi ritè præmiſſis.

De angina.

Angina inter Ver & Æſtatem ut plurimum aggreditur. Sequuntur febris inſultum dolor & faucium inflammatio, unde à tumore uvulæ, tonſillarum & laryngis, nec deglutire queat Æger, nec ſpiritum ducere.

Mittatur Sanguis è Brachio copioſé. Tangantur partes inflammatæ *melle Roſaceo, Sp. Vitrioli, vel Sp. Sulphuris ad ſummum acorem permixto, vel Sp. Vitrioli ſolo.* Mox Gargariſma ſequens uſurpetur, non vulgari modo; ſed ita ut ſine ulla agitatione in ore contineatur, donec incaleſcat; dein expuatur, & repetatur ſubindè.

℞ *Aq. Plantag. Roſ. Rubr. & Sperm. Ranar. an.* ℥iv, *album. ovor. in aquam agitando redact. N°* iij, *Sacchar. Cryſtal.* ʒiij, *M. f. Gargariſma.*

Emulſio Refrigerans in Pleuritide deſcripta indies ſumatur.

Sequenti manè, niſi febris & dolor inter deglutiendum remiſerint, Venæſectio repetatur, Catharſi in diem poſterum rejectâ, aliàs Catharticum lenitivum exhibeatur.

Manente adhuc affectu (quòd oppidò rarum) repetatur adhuc Venæſectio, & Catharſis; Epiſpaſticum amplum ac forte applicetur

plicetur cervici poſt primam Venæſectionem.

Omni manè, niſi diebus purgationi datis Enema refrigerans & Emolliens injiciatur; Diætâ tenui utatur æger, & lecto per horas aliquot quotidie abſiſtat.

In his omnibus Febribus, quas intercurrentes appello, ut etiam in illa, quæ ſtationaria eſt, cautè obſervandum, quòd æger à lecto abſtineat magnam diei partem, ut juſculis hordeaceis, avenaceis, ac id genus aliis victitet, & cereviſiam tenuem Lupulatam & hydrogalam pro potu ordinario bibat.

De Morbillis.

Infantes plerumq; impetunt. Primo die rigent horréntque, calent & frigent alternatim. Secundo conſummatam febrim accerſunt. Ægritudo vehemens, ſitis, inapperentia, lingua alba (non verò ſicca) tuſſicula, capitis & oculorum gravedo, & ſomnolentia perpetua, acriter premunt, humor è naribus & oculis jugiter ſtillat (quæ lachrymæ certiſſimum morbillorum ſignum.) Huc accedunt ſternutatio, tumor palpebrarum pauló ante eruptionem, vomitus, diarrhœa, cum dejectionibus colore viridi in dentientibus præſertim. Symptomata ingraveſcunt ad quartum uſq; diem, quo quidem die (nonnunquam quinto) in fronte & facie maculæ par-

væ, rubræ, pulicum morſibus perſimiles prodeunt, quæ numero & magnitudine auctæ racematim coaleſcunt, & faciem maculis rubris majuſculis interſtinguunt: Hæ maculæ è parvulis papulis, ſupra cutim paululum elevatis conflantur, quarum protuberantia digito levi, vix oculorum acie, deprehendi poſſit.

A facie, quam primò ſolùm occupant, ad pectus ventrémque, crura deinde tibiáſque propagantur maculæ; in his autem partibus latæ & rubræ, ſuperficiem cutis non ſuperantes conſpiciuntur. Eruptione morbillorum non perinde deliniuntur Symptomata ac in variolis. Vomitus poſt eruptionem nullus; ſed tuſſicula & febris cum ſpirandi difficultate intenduntur, in oculos defluxio, ſomnolentia & inappetentia perſeverant. Die ſexto aut circiter frons & facies aſpereſcunt, emorientibus puſtulis, ruptâq; cuticulâ, in reliquo corpore maculæ latiſſimæ ſunt, & maximè rubeſcunt, Octavo circiter die in facie evaneſcunt, & vix in reliquo corpore permanent. Nono nullæ prorſus ſunt; per faciem verò & artus, quandoq; & totum corpus in farinam quandam & ſquammulas faceſſunt. & tunc temporis febris, ſpirandi difficultas & tuſſicula augentur. In adultis à calido regimine liveſcunt primò, mox nigreſcunt exanthemata.

℞ *Decoct. Pectoral.* ℔ij ß, *Syrup. Violac. & Cap. Ven. an.* ʒiß, *M. f. Apozema*; Cap. ʒiij, vel *iv.* ter vel quater in die.

℞ *Ol. Amygd. dulc.* ʒij, *Syr. Violar. & Cap. Ven. an.* ʒj, *Sacchar. Cand. albiſſ. q. ſ. M. f. Eclegma*, de quo ſæpius lambat, præcipuè quando tuſſis urget.

℞ *Aq. Ceraſor. nigr.* ʒiij, *Syr. de Mecon.* ʒj, *M. f. hauſtus* ſingulis noctibus ſumendus, à primo morbi inſultu, uſq; dum convaluerit æger, doſin augendo vel imminuendo pro ratione ætatis.

Æger ſe contineat in lecto per biduum poſt primam eruptionem.

Si poſt Morbillorum diſceſſum, Febris, reſpirandi difficultas, & alia Symptomata Peripneumoniam mentientia ſupervenerint, ſanguis liberaliter extrahendus è brachio, ſemel, bis, vel ter, prout opus fuerit, convenienti ſpatio interpoſito inter ſingulas Venæſectiones; Atq; etiam continuentur *decoctum Pectorale ſupra deſcriptum*, ut & *Lohoch*, vel *Ol. Amygd. dulc. per ſe.* Circa diem *xij*, ab invaſione Cathartico lenienti purgetur.

Diarrhœa, quæ morbillos excipit, Venæſectione ſanatur.

De Variolis.

Diſtinctæ ſunt vel confluentes, & in diſtinctis invadunt rigor & horror, calor intenſus, capitis & dorſi dolor vehemens, vomituritio, in adultis ingens in ſudores propenſio (& hinc minimè confluxuras eſſe licet conjicere) dolor ſub ſcrobiculo cordis ſi manu prematur, ſtupor & ſomnolentia, nonnunquam & inſultus epileptici (in infantibus præſertim) quibus ſi, dentitione peractâ, corripiantur, in procinctu eſſe variolas poſſis prædicere, ita ut ſi fortè inſultum epilepticum ſub veſperam patiantur, ſequenti Aurorâ in conſpectum ſe dabunt variolæ, mites ut plurimùm & rariſſimè confluentes. Quarto incluſivè ab invaſione die, nonnunquam ſeriùs, rarò tamen ante illum erumpunt, quo tempore vel minuuntur Symptomata vel prorſus evaneſcunt. In eruptione autem ſubrubræ primò puſtulæ, tenuiſſimarum acicularum puncta æquantes, ſparſim ſe produnt per faciem, collum, pectus, & corpus univerſum; tunc in faucibus dolor, qui cum puſtulis ſurgentibus augetur. Circiter octavum à primo inſultu diem intervalla puſtularum priùs alba rubere jam incipiunt, in tumorem attolli, & dolore tenſivo affici; extenduntur palpebræ, & ut veſica inflata, oculos claudunt. Proximæ à facie intumeſcunt manus,

manus, digitiq; diſtenduntur; puſtulæ faciei antea læves & rubræ, jam aſperæ (primum maturationis indicium) & ſubalbidæ apparent, ſuccum in ſuper luteum, colore à favo non abludentem evomunt, faciei & manuum inflammatio jam ſummæ in puſtularum interſtitiis colorem exhibet floridum, & roſarum Damaſcenarum æmulum, quem quidem colorem, quo mitiores ſunt variolæ, eo magis tum puſtulæ tum cutis interjecta ad amuſſim exprimunt: Quæ faciem occupant puſtulæ, aſperiores quotidie ac magis flavæ pro maturationis ratione; quæ manus & reliquum corpus minùs aſperæ albæq; magis conſpiciuntur indies. Die undecimo faciei tumor & inflammatio recedunt, puſtulæ maturæ & juſtam magnitudinem (viz. piſi grandiuſculi) adeptæ exareſcunt decidúntque. Decimo quarto vel quinto pereunt funditus; manuum autem puſtulæ pertinaciores, albæ adhuc & recentes die uno aut altero moras trahunt & tandem dirumpuntur, cæteræ autem, faciei nimirum & corporis deſquammantur, & in facie ſquammulis hiſce furfuraceis ſuccedunt foveæ. Per totum morbi decurſum alvus vel prorſus conſtipatur vel rariſſimè dejicit. Maxima eorum pars, qui ex hoc morbo pereunt, octavo die in diſcretis, undecimo autem in confluentibus intereunt: Quippe cùm in diſcreto hoc genere promoventur ſudores tum cardiacis tum regimine

calidiore, prædicto die facies, quæ turgida & per interſtitia puſtulis interjecta inflammari debuerat, è contra flaccida reperitur & albeſcens, puſtulis nihilo minus rubentibus & elevatis, etiam poſt ægri mortem; ſudor, qui huc uſq; manaverat, derepentè evaneſcit, æger interim phrenitide corripitur, anxietate, jactatione, ægritudine, vehementibus, urinam parcè reddit ac frequenter, & tandem pauciſſimarum horarum ſpatio ad plures migrat.

In Confluentibus eadem Symptomata (ſed atrociora) febris ſcilicet, anxietas, ægritudo, vomituritio, &c. immaniùs ſæviunt; licèt non ita promptè, ac in diſcretis, in ſudores diſſolvitur æger. Diarrhœa nonnunquam eruptionem præcedit, & ad diem unum aut alterum poſt illam protrahitur, quod in diſcretis vix contingit. Tertio die aut citiùs, rarò tardiùs, erumpunt; & quo citiùs, eo magis confluunt. Quandoq; ad quartum vel quintum diem differtur eruptio ob atrox aliquod ſymptoma, v. g. acutiſſimum dolorem in lumbis, nephritici æmulum, in latere pleuritici, in artubus rheumatici, in ventriculo cum ingenti ægritudine & vomitu. Non perinde, ac in diſcretis, mox ab eruptione remittunt ſymptomata, ſed & febris & alia ad multos etiam dies poſt eruptionem puſtularum ægrum diſcruciant: Nunc eryſipelatis ritu, nunc morbillorum erumpunt, eruptionis

nis licèt tempore planè distinguantur. Crescente morbo, non in molem aliquam spectabilem attolluntur; sed in facie sibi invicem implicitæ, tanquam vesicula rubra, vultum omnem contegunt, quem maturiùs elevant quàm discretæ: postmodum ad instar pelliculæ albæ vultui agglutinatæ cutis superficiem non admodum superant. Præterlapso die octavo, pellicula alba quotidie paulatim magis exasperatur, colore fusco: Intensus magis est dolor cutis, donec tandem in truculentiori morbo non nisi post diem vicesimum latioribus laminis desquammatur. Hoc interim observatu dignum, quòd quanto pustulæ matureſcentes propiùs ad colorem subfuscum vergunt, eò deteriores lentiùs abscedunt; quo magis autem flaveſcunt, eò minus confluxerint, & ocyùs se propipiunt. Ubi primùm deciderit pellicula, nullâ scrabritie vultus afficitur; at verò mox illam excipiunt squammulæ furfuraceæ, indolis perquam corrosivæ, quæ foveas relinquunt patentiores, & sæpe cicatrices. Quandoq; humeri & dorsum cuticulâ denudantur. Morbi periculum à pustularum frequentia & numero in facie solâ, æstimandum. Pustulæ manuum & pedum majores, & quo altiùs ab extremitate artuum ascenderis, eo sensim minores & contractiores extant. In adultis salivatio, in infantibus diarrhœa (licèt non ita certò) confluentium comes. Ptyalismus

nunc cum eruptione ſe prodit, nunc biduo triduóve præterito, materiam primò tenuem, die undecimo viſcidiorem ægerrimè, excreat. Siticuloſus eſt æger, voce raucâ, ſomnolentiâ & ſtupore ingentibus corripitur, inter bibendum ſubinde tuſſit, & potus per nares revertitur. Tunc ceſſat ut plurimum ſalivatio, cui niſi faciei intumeſcentia (quæ licèt hoc ipſo die pro morbi genio aliquantiſper remitti debeat, non tamen niſi poſt diem unum alterúmve omnino recedere) & manuum jam inſigniter incipiens & diutiùs perdurans ſuppetias tulerint, ægro protinus moriendum eſt. Diarrhœa non ita matutè infantes occupat, ac ptyaliſmus adultos. In utraq; variolarum ſpecie febris ab inſultu ad eruptionem dominatur, inde dat inducias ad puſtularum maturationem, quâ peractâ, deſinit. Superveniunt à malo regimine ſymptomata anomala; qualia ſunt, puſtularum flaccidiras & ſubſidentia, phrenitis, coma, maculæ purpureæ puſtulis interſperſæ, & in earum ſummitate maculæ nigræ exiguæ in medio ſubſidentes, ſanguinis mictus & ſputum ſub initio morbi, urinæ ſuppreſſio.

Separationis tempus cum febrili ebullitione tribus vel quatuor primis diebus tranſigitur: Expulſio per reliquum morbi tempus, mediantibus parvis abſceſſibus, in carne perficitur.

Mit-

Mittatur ſanguis quovis ex tribus primis diebus ab invaſione ad ℥ix, vel x, & poſtea *Vomitorium* exhibeatur *ad* ℥j, vel ℥jſs, *Infuſionis Croci Metallorum.*

His primis diebus diluatur ſanguis frequenti potatione Cereviſiæ tenuis Lupulatæ.

Cum variolæ omnes eruperint (quod ut plurimum eſt ſexto die poſt invaſionem) veſperi propinetur *Syr. de Mecon.* ℥j, quæ repetatur dehinc ſingulis noctibus ad diem decimum poſt invaſionem. Eâ nocte, ſi Variolæ è Confluentium genere fuerint, augeatur doſis ad ℥jſs, quæ dein repetatur ad ℥j, manè, & ad ℥jſs, ſerò, ſingulis noctibus, donec æger convaluerit.

Si Syr. de Mecon. minus congruat, ſubſtitui poſſit *Laudan. Liquid.* viz. *gutt. xviij, pro* ℥j, *Syrupi & gut. xxv, pro* ℥jſs. Hoc interim obſervandum, quod ſi paregoricum bis in die exhibitum orgaſmum compeſcere non valeat (quod in Variolis inſigniter confluentib. ſub finem earum ſæpe accidit) tum 8ª quâq; horâ exhibendum, vel ſæpius, ſi opus fuerit.

At ſi Variolæ Interſtinctæ fuerint, ſatis erit, ut ſolummodo ſingulis noctibus poſt plenam eruptionem exhibeatur Paregoricum, atq; etiam in minori doſi.

Qualiſcunq; autem generis variolæ fuerint, atq; etiam qualicunq; morbi tempore, ſi Phrenitis acciderit, omnino oportet utinordinato ſpirituum motui frænum injiciatur,

ac

ac proinde ſi prior Paregorici doſis metam non attingat, alia atq; alia aſſumatur, donec tumultus penitus compeſcatur, interpoſito inter ſingulas doſes ſpatio aliquo; ut pernoſcere valeamus, utrùm doſis ultima id, quod quærimus, præſtiterit, antequam nova ingeratur.

Si omnimoda urinæ ſuppreſſio acciderit, æger è lecto eximatur, & aliquantulum obambulet.

Si ſaliva ob calorem ſit adeò viſcida, ut expectorari non poſſit, tum Gargariſma cum Syringa ſæpe in fauces injiciatur. Componatur *è Cereviſia tenui* vel *aq. hord. cum Melle Roſarum*; vel ſequens uſurpari poterit.

℞ *Cort. Ulmi* ʒvj, *rad. Glycyrrhiz.* ʒß, *Paſſular. enucleat. N°. xx, roſ. rub. p. ij, coq. ſ. q. aq. ad* ℔jß, *in Colatur. diſſolv. oxymel. ſimp. & mell. Roſar. an.* ʒij, *M. f. Gargariſma.*

Si die undecimo, vel alio quovis poſt eum, febris ſecundaria cum inquietudine, jactatione, & cæteris id genus ſymptomatis, uſq; adeò efferatur, ut Paregoricis utcunq; repetitis ſufflaminari nequeat, & mors quaſi immineat, tum ſanguis ad ſatis magnam quantitatem illicò detrahatur, nempe ad ʒxij, vel circiter, atq; porrò repeti poſſit ſemel vel bis in ſequentib. diebus, ſi ſymptomatum dictorum ratio idem poſtulârit; at non aliás.

aliás. Catharsis etiam blanda die decimo tertio (non antea) vel quovis alio die eum insequente (modo Venæsectio præcesserit) institui possit, nempe ex *Electuarii Lenitiv.* ℥j, *dissolut. in aq. Cichor.* vel. *lactis Alexeter.* ℥iiij. Veruntamen nec Venæsectio nec Catharsis impediunt, quo minùs Paregorica in usum veniant, quæ, (haud obstantibus iis) tam quoad largam dosin quàm repetitam exhiberi debent, si opus adhuc fuerit: nam ad hæc in hoc morbo semper confugiendum.

Quando Pustulæ perfectè exaruerint, inungatur facies Linimento ex æqualib. partib. ol. Amygd. dulc. & Pomat. per biduum; at non ultra.

Die *xxj* post invasionem mittatur sanguis è brachio; & sequenti die Catharsis celebranda, quæ porrò alternis diebus ad tres alias vices repetatur.

Quoad Regimen; è lecto abstineat ad sextum diem post invasionem, in quo postea se contineat usq; ad *xvij*, non aliis stragulis tectus, quàm quibus sanus uti solebat.

Jusculis Avenac. hordeac. Pomis coct. & Cerevisiâ tenui victitet, & post undecimum diem vini Hispanic. Cochl. *iij* vel *v*, bis in die exhibeantur, si æger voluerit.

Si

Si crurum tumor non evacuationibus præſcript. cedat, tum fotu fol. Malv. verba ſc. Sambuc. Lauri, cum floribus Camæmel. & Melilot. in lacte coct. facilè fugatur.

Si primis morbi diebus æger Hæmoptoë laboret, vel urinam reddat ſanguineam, tum pulvis & tinctura, quæ in capite de Hæmoptoë præſcribuntur, ſextâ quâq; horâ (donec ſymptomata iſta prorſus ceſſaverint) diligenter exhibeantur. Quo etiam caſu Paregorica liberali manu propinanda.

De chorea Sancti Viti.

Convulſionis ſpecies quædam eſt, pueros puellaſve à decimo ætatis anno ad pubertatem invadit, prodit ſe claudicatione, vel inſtabilitate alterutrius cruris, quod æger poſt ſe trahit fatuorum more; manum ejuſdem lateris, vel pectori vel alii alicui parti applicitam, nequit continere in eodem ſitu horæ momento, ſed in alium ſitum & locum convulſione diſtorquebitur, quicquid æger contra nitatur. Antequam poculum ad os poſſit adducere, mille geſticulationes, circulatorum inſtar, exhibebit: Non enim rectâ lineâ ori admovet, ſed deductâ à ſpaſmo manu, huc illuc aliquandiu verſat, donec tandem fortè fortunâ labris propiùs apponens liquorem derepentè in os injicit, & avidè haurit;

haurit; deditâ tanquam operâ, ut ſpectantibus riſum moveret.

Sanguis ad ʒviij, plus minus, pro ætate, ex brachio educatur.

Die ſequenti, dimidia pars, vel quiddam amplius, pro ratione ætatis, potionis communis hauriatur; & veſperi hauſtulus ſequens propinetur.

℞ *Aq. Ceraſor. nigr.* ʒj, *aq. Epilept. Langii* ʒiij, *Theriac. Andromach.* ℈j, *Laudan. Liquid. gutt. viij*; *f. hauſtus.*

Potio Cathartic. ad tres vices, alternis diebus, repetatur; & *hauſtus Paregoricus* iiſdem noctibus.

Poſtea Sanguis iterum extrahatur; & ad Catharſin, uti priùs, æger revertatur, & ſic ſanguis mittatur, & alvus ſubducatur ad tertiam quartámve vicem; ſpatio tamen inter alternas evacuationes obſervato, ut nihil periculi ægro immineat.

Diebus a purgatione vacuis ſequentia præſcribantur.

℞ *Conſerv. Abſinth. Roman. & flaved. Aurantior. an.* ʒj, *Conſerv. Anthos* ʒſs, *Theriac. Andromach. vet. & nuc. moſchat. condit. an.* ʒiij, *Zinzib. condit.* ʒj, *Syr. è ſucc. citr. q. s. f. Electuar.* de quo capiat ad magnitud. nuc. moſchat. manè & horâ quintâ pomeridianâ, ſuperbibend. vini ſequentis Cochlear. v.

℞

℞ *Rad. Pæoniæ, Enul. Campan. Imperator. & Angelic. an.* ʒj, *fol. Rut. Salv. Betonic. Chamædr. Marrub. alb. & ſummitat. Centaur. min. an.* Mj, *Baccar. Juniper.* ʒvj, *Cortic. duor. Aurantior. Incidantur & infundantur frigidè in vini Canarini* ℔vj. Coletur tantummodo uſûs tempore.

℞ *Aq. Rut.* ʒiiij, *aq. Epilept. Lang. & Bryon. comp. an.* ʒj, *Syr. Pæon.* ʒvj; *M. f. Julap.* cap. Cochl. iiij ſingulis noctibus cubitum iturus, inſtillando *Sp. C. C. gutt.* viij.

Applicetur plantis pedum Emplaſt. è Caranna.

Ob Recidivæ metum pertundatur ei vena, & ad dies aliquot purgetur, eâ ipsâ anni ſequentis tempeſtate (vel paulo ante) quâ morbus invaſit.

Veriſimile mihi videtur, quòd hæc methodus curationi Epilepſiæ Adultorum convenire poſſit, quod tamen non adhuc expertus ſum. Cum verò Chorea *Viti* ætates teneras adoriri ſoleat, in Epilepſia Adultorum tam ſanguinis detrahendi quantitas, quàm Catharticorum doſis adaugeantur.

De apoplexia.

Somnus eſt profundiſſimus, & omnimoda ſenſûs & motûs privatio, exceptâ reſpiratione,

ne, quam ægri habent difficilem cum ſtertore.

Mittatur Sanguis è brachio ad ℥xij quamprimum, ac poſtea ex venis jugularibus ad ℥viij, deinde *Vomitorium ex* ℥jß, *vel* ℥ij, *Infuſ. Croc. Metal.* propinetur ſtatim.

Emplaſtr. Epiſpaſtic, ſatis amplum ac forte cervici applicetur.

Dum hæc aguntur, erectus ſedeat æger in lecto, nec ſtragulis nimis obrutus.

Sp. Sal. Ammoniac. optimè rectificatus admoveatur naribus.

Finitâ Vomitorii Operatione, ſubinde exhibeantur Coch. iij vel iiij ſequentis Julapii.

℞ *Aq. Rutæ* ℥iiij, *aq. Bryon. compoſ. & Antiepilept. Lanz. an.* ℥j, *Sp. C. C. gutt.* xx. *Sacchar. Cryſtal. q. s. f. Julap.*

Vel *Cochleare* j *Sp. Lavendulæ compoſ.* per ſe propinari poſſit bis vel ter, durante paroxyſmo, horâ dimidiâ vel integrâ interpoſitâ.

Cavendum eſt, ne Cardiaca plus juſto calida, ac nimis frequenter (uti mos eſt) exhibeantur; nam quacunq; demum ſpecificâ virtute pollere videantur, plus damni quàm emolumenti ægro apportant, utpote quæ humores fundere (ac proinde malum augere) apta nata ſunt: quod etiam incommodum non

non minùs infertur ex nimia ſtragulorum congeſtione.

Paroxyſmo jam finito, ad præcavendam recidivam ſequentia exhibeantur.

℞ *Pil. Coch. maj.* ℈ij ; cap. tertiâ quâq; die per 6 vices horâ 4ª matutinâ, ſuperdormiendo.

℞ *Conſerv. flor. ſalv. Roriſmarin. an* ℥j, *Conſerv. flaved. Aurant.* ℥vj, *nuc. moſchat. condit. & Zinzib. condit. an.* ℥ß, *Theriac. Andrem. vet.* ℈ij, *pulv. elect. diamb. diamoſch. dulc. an.* ℥j ; *cum s. q. Syr. conditur. citr. f. opiata*, capiat ad magnitudinem Caſtaneæ manè & ſerò, ſuperbibend. *aq. Epilept. Lang. Coch. ij.*

℞ *Ambr. griſ.* ℥ß, *ol. deſtil. ſem. Aniſi, cinnamom nuc. moſchat. an. gutt. ij, ol. Caryophyl. gutt. j. Sacchar. in aq. flor. aurantior. ſolut.* ℥iiij *f. s. a. Tabellæ*, quarum capiat unam ad libitum.

Abusû potus generoſioris cujuſvis ſibi temperet, veſcatur juſculis avenaceis, hordeaceis, ut & ex pullis gallinaceis confectis, & quandoq; etiam (præcipuè inter purgandum) carne pullorum agnorum ac id genus ciborum eupeptωn.

De

De opthalmia.

Ex oculorum inflammatione patet.

Mittatur Sanguis è brachio ad ℥x. Sequenti die ſumat potionem purgativam communem, quæ repetenda eſt per duas alias vices, duobus diebus interpoſitis; iiſdem noctibus ſumat *hauſtum paregoricum ex Syr. de Meçon.* ℥j.

Diebus à purgatione vacuis ſumat ter aut quater in die ℥iiij *Emulſionis ex ſem. frigid. maj. & Papav. alb.*

℞ *Aq. Plantag. Roſ. rubr. & Spermat. Ranar. an.* ℥j, *pulv. Tutiæ preparat.* ℈j; *f. Collyrium*, cujus guttæ aliquot inſtillentur oculis bis in die; at non incipiendum, niſi poſt primam purgationem.

Si his remediis affectus haud cedat, repetatur Venæſectio ſemel vel bis, (præcipuè ſi ſanguis Pleuriticus apparuerit) ut etiam Catharſis.

Abſtineat ab uſu vini & cujuſvis liquoris generoſi, ab uſu etiam ciborum coctu difficilium, & ſale condìtorum; & diebus inter purgationes bibat hydrogalam coctam.

Nota, quòd ſæpè accidit, quòd Venæſectioni & Catharſi utcunq; repetitis Opthalmia non cedit; hoc in caſu *Paregoric. ex Syr. de*

de Mecon. ʒj ſingulis noctibus exhibitum, curationem ſine aliorum ſuppetiis abſolvit.

De Uteri Procidentia.

℞ *Cort. Querc.* ʒij ; *coq. in aq. font.* ℔iiij *ad* ℔ij, *ſub finem addendo Cortic. Granator. contuſ.* ʒj, *roſ. rubr. flor. Granator. an* Mij, *dein adde vini rubr.* ℔ß ; Colatura ſit pro fotu, qui cum pannis laneis parti affectæ admoveatur manè horis duabus, antequam è lecto aſſurgat, & nocte poſt decubitum, donec ſymptoma penitus evanuerit.

De paroxyſmo nephritico.

Adſunt dolor fixus in lumborum regione, urina cruenta, arenularum aut calculi excretio, ſtupor cruris è directo renis laborantis, teſtis retractio ejus lateris, in quo eſt dolor, nauſea & vomitus. Dolor colicus nephritico haud abſimilis ; licèt in quibuſdam ſymptomatis planè diſcrepet, quæ recenſita in *Capite de colica biliosa* videas.

Si Æger temperamento ſanguineo fuerit, mittatur ſanguis è brachio affecto reni reſpondenti ad ʒx ; dein *liquoris poſſetici cui Rad. Althææ* ʒij. *incoctæ fuerint Cong. j* ; quam citiſſimè deglutiatur ; & Enema ſequens injiciatur.

℞

℞ *Rad. Althææ & Lilior. an* ℥j, *fol. Malv. Parietar. Branc. Urſin. & flor. Chamæmel. an. M. j. Sem. Lini & fænugræc. an.* ℥ß; *coq. ſ. q. aq. ad* ℔jß; *M. f. Enema.* Rejectis Vomitorio & Enemate, *Laudan. Liquid. ſatis magna doſi* propinetur, viz. *ad gutt. xxv*; vel *Pil. Matth.* gr. *xv, vel xvj*: In ſenibus verò, & morbo diuturno fractis, ut & vetulis Vaporibus obnoxiis (præcipuè ſi ſub initium Paroxyſmi urinam eæ reddant nigram & ſabuloſam) Venæſectio omittatur; at quoad reliqua, eâdem quæ dicta eſt viâ omnino procedendum.

De dyſenteria, diarrhœa & teneſmo.

Rigent horrêntque, ſequitur deinde totius corporis calor, quem brevi excipiunt ventris tormina, & hæc dejectiones crebræ, & mucoſæ omnes (niſi quòd ſtercoroſæ nonnunquam interponantur) cum ingenti cruciatu & moleſtiſſimo viſcerum omnium quaſi defcenſu, quoties exoneratur alvus, ſanguinis interim lineamentis intertextæ, licèt aliquando ne minimum ſanguinis per totum morbi decurſum admiſceatur. Progreſſu morbi ſanguis ſincerus quandoq; excernitur, & gangrænâ inſanabili afficiuntur inteſtina. Si æger ætate floreat, vel cardiacis incaleſcat, febricitat admodum, lingua eſt ſubalbida, quadam

quadam mucilagine densè obsita, interdum nigra & ficca. Prosternuntur vires, dissipantur spiritus, aphthæ insuper oris interna faucésq; obsident, præsertim ubi materiæ peccantis evacuatio adstringentibus præpostèrè impeditur, non exacto per cathartica morbi fomite. Aliquando, exulante febre, agmen ducunt tormina, & cætera morbi symptomata sequuntur.

In diarrhœa humores excrementitii sine sanguine aut intestinorum exulceratione excernuntur.

In tenesmo assidua est desidendi cupiditas, nihil tamen præter mucosum quoddam & subcruentum aut purulentum rejicitur.

Mittatur sanguis è brachio quamprimum, eademq; nocte *Paregoricum* propinetur; & mane sequenti *potio purgans communis*, repetenda alternis diebus ad duas alias vices, & *Paregoric.* post Purgationes, quamprimum suo defunctæ sunt munere; ac diebus à purgatione vacuis idem manè & serò est exhibendum.

Post Venæsectionem & Catharsin semel celebratam, per totum morbi decursum, sequens Cardiacum exhibeatur.

℞ *Aq. Cerasor. nigr. & fragor. an.* ℥iij, *Aq. Epidem. Scord. comp. & Cinnam. hordeat. an.* ℥j, *Margarit. præparat.* ʒjß, *Saccharor. crystal. q. s. adde aq. Rosar. Damascen.* ʒß, *ad gratum saporem,*

porem, M. f. Julap. de quo cap. cochl. *iiij* vel *v* in languoribus, vel ad libitum.

Potus sit Lac coctum cum aq. triplo, vel Decoctum alb. ut,

℞ *C.C.C. & micæ panis albiss. an.℥ij, coqu. in. aq, font. ℔iij ad ℔ij, postea s. q. sacchar. albiss. edulcoretur.* Vel si dejectio virium postulaverit, *Aq. font. ℔ij cum vin. Canarin. ℔ß simul coctæ* pro potu frigidè assumantur.

Cum per tres vices purgatus fuerit æger, tota curatio usui *Laudani* bis vel ter in die repetiti postea incumbit, nisi quòd *enema ex lact. vaccin. ℔ß, & Theriac. Androm. ℥iß* subinde injiciatur, quod in alvi egestionibus mirè confert.

Cum alvi fluxus in Diarrhœam tantùm assurgat, Phlebotom. & Catharsi præscript. omissis, sequ. Bolus singulis matutinis exhibeatur.

℞ *Rhabarb. pulv. ʒß (plus minus pro ratione virium) cum s. q. Diascordii f. Bolus, addendo ol. Chym. Cinnamom. gutt. ij.*

Noctibus insequentibus *Paregoric. ex aq. Cinnamom. hordeat ℥j, & Laudan. Liquid. gutt. xiiij exhibeatur.*

Ubi tormina sicca sine dejectionibus excruciant, curantur diluendo sero lactis frigide propinato, &tepidè injecto; ut in Cholera morbo pullorum jusculo aut lacte cerevisiato.

Si

Si hic morbus diutius excurrat, adeò ut omnis ejus vis in rectum inteſtinum decumbat, cum aſſidua deſidendi cupiditate, Diæta Analeptica inſtituatur, & liquor aliquis Cardiacûs pro libitu ingeratur, ut reſtaurari poſſint vires, quibus redeuntibus, Teneſmus ſponte ſe proripit.

In dyſenteria malè curata dolores aliquando ægrum ad annos aliquot diſcruciant, in hoc caſu Phlebotomia repetita priſtinam ſanitatem reſtituet.

Norandum eſt, quòd in conſtitutionibus huic morbo minùs faventib. omiſſis evacuationibus dyſenteria Laudano ſolo ſanatur, quod manè & ſerò repetendum, donec ſymptomata penitus evanuerint, vel etiam ter Nycthemeri ſpatio, ſi opus fuerit.

De colica biliosa.

Inteſtinorum dolor atrociſſimus eſt, per horas aliquot affligit febris in hunc morbum deſinens, qui aut quaſi injectâ faſciâ conſtringit, aut in punctum contractus quaſi terebello perforat; ſubinde remittitur, mox recrudeſcit. Sub initio non ita certò ad unum aliquod punctum determinatur, neq; tam crebra vomituritio, neq; alvus ita pertinaciter catharticorum vim eludit; quo autem magis augetur dolor, eo obſtinatiùs in puncto figitur, vomituritio frequentior, & major

major alvi adſtrictio, colicâ tandem in iliacam tranſeunte. A nephritide ſic diſtinguitur. 1. Dolor nephriticus fixus in rene eſt, & ab eo ad teſtem exporrigitur ſecundùm longitudinem ureteris. Colicus verò vagus eſt, & cinguli inſtar medium ventrem affligit. 2. A paſtu colicus dolor augetur: Nephriticus potiùs imminuitur. 3. In colico dolore, ab excretione per alvum & per vomitum majus levamen emergit, quàm in nephritico. 4. In dolore nephritico urina primùm clara & tenuis, poſtea aliquid ſubſidet, & tandem arenulæ aut lapilli excernuntur: In colica urinæ ab initio craſſiores exiſtunt.

Sanguis è brachio paulò liberaliùs educatur, & poſt horas *iij* vel *iiij Anodyn.* exhibeatur, Poſtero die *Cathartic. Lenitiv.* &, interpoſito die uno, ad tertiam vicem propinetur.

Ar ſi malum hoc fructibus horariis, vel aliis cibis avidè ingeſtis, originem debeat, tum ventriculus ante omnia lacte cereviſiato affatim hauſto eluendus eſt; quo exantlato, Anodynum propinandum eſt; ſequenti autem die vena ſecanda eſt, & in ordine præſcripto procedendum.

Ubi hic morbus minùs penitè tractatus diutiſſimè fatigaverit, & ægrum penè confecerit, liberalior ſive aquæ Epidem. ſive Mirab. ſive aliùs cujuſcunque, qua fanus maximè

delectatur, usus, ægrum hoc tempore ultra spem omnem juvit.

De cholera morbo.

Intra Augusti limites se continens, vix in priores Septembris hebdomadas evagatur. A crapula & ingluvie excitatus similis affectus, nullo temporis discrimine insurgit, qui licèt eodem curetur modo, alterius tamen est subsellii. Adsunt vomitus enormes, ac pravorum humorum cum maxima difficultate & angustia per alvum dejectio; ventris ac intestinorum dolor vehemens, inflatio & distentio; cardialgia, sitis; pulsus celer ac frequens, parvus & inæqualis; æstus & anxietas, nausea molestissima, sudor, crurum & brachiorum contractura, animi deliquium, partium extremarum frigiditas, & similia, quæ ægrum in 24 horarum spatio interimunt.

Pullus tenerior in tribus circiter aq. font. Congiis elixetur, ut carnis saporem vix perceptibilem liquor referat, hujus decocti vel (defectu ejus) liquoris potetici capaciores aliquot cyathos æger tepidè exhauriat; & eodem tempore ex eodem liquore *Enemata* successivè repetenda. Haustibus & Clysteribus *Syr. Lactuc. Violar. Portulac. Nymphææ, eorúmve* alicujus uncia subindè admisceri poterit.

Ex-

Exantlato hoc Eluvionis penſo (quod *iij* vel *iiij* horas ſibi vendicat) *Paregoricum* curationi Coronidem imponit.

Si non acceſſerit medicus, niſi poſtquam æger vomitu & dejectionibus per multas horas continuatis fuerit exhauſtus, & jam frigeſcant membrorum extrema, tum ad *Laudanum Liquidum* confugiendum eſt in paulò majori doſi, (viz. *Laudan. Liquid. gutt. xxv. in aq. Cinnomom. fort.* ʒj) & cum ceſſaverint ſymptomata, nihilominus manè & ſerò quotidiè eſt repetendum; at in minori doſi, donec priſtinas vires receperit.

Eſt ſpecies quædam choleræ morbi infantibus valdè familiaris, ac ſæpenumerò funeſta, ex Dentitione vel Crapula originem ducens.

Horum ætas tenella minimè ferr, ut diluatur ventriculus largâ liquorum potatione, multò minùs ut Catharticis tumultus major in humoribus excitetur, ſed Curationem *Laudano* ſolo aggredi oportet; quamobrem *gutt. ij, iij,* vel *iiij, vel plures,* pro ratione ætatis, Cochlear. *j*, cereviſiæ tenuis vel Aquæ cujuſvis appropriatæ inſtillatæ exhibeantur, repetantúrque, ut opus fuerit.

De Colica Pictonum.

Eſt ſpecies quædam Colicæ, quæ degenerare ſolet in Paralyſin, & motûs omnimodam manuum ac pedum depravationem; quam hoc nomine *Riverius* in capite de Paralyſi indigitat, & apud inſulas *Caribum* notiſſima eſt; utpote, quæ magnam vim hominum infeſtat.

Hunc dolorem atrociſſimum ſanat *Balſam. Peruv.* frequenter ac in magna doſi exhibitum, nempe ſi *ejus gutt. xx, xxx vel xxxx, Sacchar. albiſſ. cochl. j, inſtillentur*, & bis vel ter in die dentur: At Paralyſis huic remedio haud cedit.

De iliaca paſſione.

Periſtalticus inteſtinorum motus invertitur, propinata cathartica & injecta enemata in emetica ſtatim tranſeunt, alvi fæces per vomitum rejiciuntur.

Mittatur ſanguis è brachio dextro ad ʒ*ix*, vel *x*. Poſt aliquot horas exhibeatur ſequens Pulvis.

℞ *Reſin. Scammon. vel (defectu ejus) Reſin. Jalap. gr. xij, Calomelan. Torquet.* ȝ*j*; *M. f. Pulvis*; cap. è Cochl. *j*, lactis vaccini, ſuperbibendo

bibendo ejuſdem lactis Cochl *j*, vel alterum, vel ſi forma Pilularum magis arrideat;

℞ *Pil. ex duob.* ʒß, *Calomel. Torquet.* ϑ*j*; *cum s. q. Balſam. Peruv. f. Pil. iiij*, ſumend. è Cochl. *j*. Syr. Violarum.

Finitâ operatione Cathartici, ſumat ſequentem hauſtum.

℞ *Aq. Cinnamom. fort.* ʒ*j*, *Laudan. Liquid. gutt. xxv*; *M. f. hauſtus*, qui porrò repetendus eſt bis, ter, vel ſæpius in die, donec vomituritio & dolor penitus ceſſaverint; atq; etiam, iſtis ſymptomatis ceſſantibus, nihilominus ad curationem confirmandam per aliquot adhuc noctes capiat idem paregoricum in minori doſi cubitum iturus.

De fluxu menſium immodico.

Menſtruorum fluxus, naturaliter conſtitutus, capacitatem teſtæ ovi anſerini implet. Patet autem immodicus ex difficili tolerantia, virium lapſu, inappetentia, cachexia, colore cadaveroſo, & pedum intumeſcentia.

Mittatur ſanguis è brachio ad ʒ*viij*; ſequenti manè ſumatur *potio purgativa communis*, repetatúrq; alternis diebus ad duas alias vices; & noctibus poſt purgationem *Paregoric. è Syrup. de Meconio* exhibeatur.

Diebus à purgatione vacuis ſumat ſequentia.

℞ *Conſerv. Roſar. ſicc.* ʒij, *Trochiſc. de terra Lemnia* ʒjſs, *Cort. Granator. Corall. rub. præparat.. & boli Armenæ, an.* ℈ij, *lapid. hæmatit. Sanguin. Dracon. an.* ℈j, *cum s. q. Syr. Cydonior. f. Elect.* de quo ſumat ad magnitudinem nucis moſchat. maj. manè & horâ 5ª pomeridianâ, ſuperbibendo ſequentis Julapii Cochl. *vj.*

℞ *Aq. Germin. Querc. & Plantag. an.* ʒiij, *Aq. Cinnamom. hordeat;* ℥ *Syr. de Roſis ſiccis an* ʒj, *Sp. Vitriol.* q. s. ad gratam aciditatem.

℞. *Fol. Plantag. & Urtic. an. q. s. Contundantur ſimul. & ſuccus exprimatur, & poſtea clarificetur,* de quo cap. Cochl. *iiij* vel *v* ſæpiuſculè ad libitum.

Poſt primam purgationem applicetur Emplaſt. ſeq. regioni Lumborum.

℞ *Emplaſt. de Minio & ad Herniam an. part. æq. extendantur ſuper alutam, f. Emplaſtrum* regioni Lumborum admovendum.

De

De colica hyſterica.

Eſt ſpecies quædam, ſeu potiùs inſigne ac valde utitatum affectionis hyſtericæ ſymptoma, cui comitem ſe adjungit dolor circa ſcrobiculum Cordis atrociſſimus, uti etiam humorum viridi colore per vomitionem ejectio.

Primò, quò Saburra vitioſorum humorum in ventriculo contentorum minùs impediat Paregorici efficaciam, ſatis magna quantitas *liquoris poſſetici* affatim ingurgitetur, atq; iterum per vomitionem rejiciatur, nempe *ejuſdem liquoris Cong.* jß, quo peracto *Laudan. Liquid. gutt. xxv in aq. Cinnamom. fort. aq. Epidem. vel aliûs vehiculi* ʒj, propinentur.

In uſu Paregoric. hoc notandum, quòd eò uſque repetendum eſt, donec ſymptomata omnia penitus ceſſaverint, debitum interea tempus interjiciendo; ut dijudicare valeamus, quid prior doſis effecit, antequam novam ingeramus.

Si ſanguineo temperamento præditus ſit æger, vel ſi antea hoc ſymptomate haud multum infeſtatus fuerit ac viribus fractus, hoc in caſu ſanguis primùm è brachio detrahendus antequam vomitorium præſcriptum propinetur.

Hâc ipsâ Methodo Clavus hyſtericus curatur. Sin verò Colica Hyſterica diuturnior fuerit per Paroxyſmos affligens: tum in eorum intervallis, ſive extra Paroxyſmum, ſeq. uſurpentur.

℞ *Zedoar. ſubtiliſſ. pulv.* ʒj ; *cum s. q. Syr. è conditur. citri f. Bolus*, ſumendus mane & ſerò per *xxx* dies, ſuperbibendo ſequentem infuſionem.

℞ *Zedoar. inciſ. minutim.* ʒß, *vini Canarin.* ʒiiij, *infundantur frigidè per xij horas*; *deinde colentur pro uſu*; vel, *Balſam. Peruv.* ut in Colica Pictonum, uſurpetur.

Quæ de Colica Hyſterica hîc dicuntur, de Colica etiam hypocondriaca dicta ſunto; ut & hoc diligenter advertendum.

Utriuſq; affectus natura ſibi vendicare videtur, ut alia atq; alia tententur, donec tandem ad illud remedium perventum fuerit, cui quaſi genuinè morbus cedit; tametſi ut plurimum Chalybs imprimis confert.

Colica Hyſterica tam in hypocondriacis, quàm hyſtericis ſæpiſſime in icterum definit, qui ſenſim ſponte ſuâ faceſſit, ſin autem longas moras nectat, exhibeatur Apozema ſequens.

℞

℞ *Rad. Rubiæ Tinctor. Curcum. an.* ℥j, *Chelidon. maj. cum toto & ſummitat. Centaur. min. an.* M*j*; *coq. in æqualib. partibus vini Rhenani & aq. fontan. ad* ℔ij, *Colatur. diſſolv. Syr. de* 5 *radicibus* ℥ij; M. *f. Apozema*, de quo capiat ℔ß, calidè manè & ſerò, uſque dum convaluerit.

De ictero, colicâ neutiquam prægreſſâ.

Color flavus in toto corpore, præſertim in oculorum albis eſt conſpicuus, quo quidem colore objecta omnia apparent affectis tincta, corporis pruritus, ſegnities, & laſſitudo, linguæ amaror, vomitus bilioſus interdum, ſingultus, egeſtio alba, urina crocea & pannum immerſum eodem colore inficiens, morbum indigitant.

Exhibeatur *potio purgativa communis*, dein aggrediatur uſum ſequentium; &, durante eorundem uſu, Catharticum præſcriptum 4° quoq; die exhibeatur.

℞ *Conſerv. Abſinth. Rom. Conſerv. flaved. Aurant. an.* ℥j, *Angelic. condit. nuc. moſchat. condit. pulv. Ari compoſ. & Chalyb. cum aceto præparat. an.* ℥ß, *extract. Centaur. min. extract. Gentian. & Cremor. Tartar. an* ℥ij. *Croc. Anglic. pulv.* ℥ß; *cum s. q. Syr. de* 5 *radicibus f. Electuarium.* de quo cap. ad magnitud.

nuc. moſchat. manè & horâ 5ª pomeridianâ (vel vice Electuarii ſumat pilulas chalybeatas) ſuperbibendo poſt matutinam doſin *aquarum mineralium purgantium* ℔iiij & poſt pomeridianam doſin *Apozemat. in Colica hyſterica deſcript.* ℔ß.

At ſi ſigna hydropis affuerint, tam manè quàm ſerò apozema ſuperbibat.

Si vel his diu continuatis morbus adhuc obſtiterit, ad *aquas ferreas* eundem eſt, quæ ex ipſo fonte ſunt bibendæ.

Ad præcavendum abortum.

Eadem præſcribenda, ac in Fluxu menſium immodico, omiſſis ſolummodò catharſi & ſuccis.

De immodico lochiorum fluxu.

Fluxum lochiorum naturalem tria conſtituunt, ſanguis ſcilicet purus, copioſus, per triduum primum fluens; dehinc ſanguis aquoſus, loturæ carnium craſſiori ſimilis, per quatriduum præter propter durans; hinc poſtmodum materia viſcoſa & mucilaginoſa, pauco aut nullo ſanguine permiſta, per quinque aut ſeptem dies prodiens, & ſic porrò ad menſis finem.

Fluxus

Fluxus autem eorum immodicus dijudicandus eſt ex virium dejectione, animi deliquio, ſanguine grumoſo effluente, cibi faſtidio, dolore in hypochondriis, ventris tenſione, pulſu debili & frequenti, viſûs obtenebratione, aurium tinnitu, & convulſionibus.

Victus incraſſans inſtituatur, & potus ſequens addatur.

℞ *Aq. Plantag. vin. rubr. an.* ℔j ; *coq. ſir mul ad tertias, & deinde edulcoretur s. q. ſacchar. albiſſ.* cujus, cum frigeſcat, cap. ℥ſſ bis vel ter in die.

Interim Julap aliquod Hyſtericum (at ſatis mite) ſubinde propinetur, & nodulus ſequens naribus applicetur ;

℞ *Galban. Aſæ fœtid. an.* ʒij, *Caſtor.* ʒjſſ, *ſal. ſuccin. volatil.* ʒß, *M. f. nodulus*, vel

℞ *Sp. ſalis Ammoniac.* ʒii ; quem ſæpe olfaciat.

De ſuppreſſione lochiorum.

Intumeſcit venter, dolor gravativus imum ventrem, lumbos & inguina occupat, facies rubeſcit, difficilis eſt reſpiratio, perturbantur oculi, rigores, febres acutæ adſunt, animi deliquia, ſudores frigidi, pulſationis & ardoris ſenſus in utero, paralyſis in partibus inferioribus, ut & interdum epilepſia.

E vestigio lecto addicatur, & *Emplast. Hystericum* umbilico admoveatur quamprimum, Elect. seq. adhibeatur;

℞ *Conserv. Absinth. Rom. Rutæ an.* ℥j, *Trochisc. è Myrrh.* ʒij, *Castor. Croc. Anglic. sal. volatil. sal. Ammoniac. & Asæ fœtid. an.* ʒß; *cum s. q. Syr. è 5 radicib. f. Elect.* cap. ad magnitud. nuc. moschat. quartâ quâque horâ, superbibendo seq. Julap. Cochl. 4 vel 5.

℞ *Aq. Rutæ* ℥iiij, *Bryon. compos.* ℥ij, *Saccharat. cand. q. s. f. Julap.* vel sumat *Trochisc. de Myrrh.* ʒj 4ª quâq; horâ.

Si tota prædictorum quantitas consumatur, & Lochia adhuc supprimantur, *Laudanum* unicâ saltem vice exhibendum ut, *Laudan. Liquid. gutt. xviij in aq. Bryon. compos. vel Laudan. solid. gr. ijß cum Asæ fœtid.* ʒß, *in pilulas duas redactum.*

Si hæc nihil proficiant, tum Enema ex lacte Saccharato, unicâ saltem vice, injiciatur.

De hydrope.

Foveæ à digitorum impressione in surarum parte inferiori sub noctem conspicuæ manè evanescentes. hoc malum primùm indicant, maximè si spiritus interim ægrîs ducatur

(haud

(haud rarò tamen fœminæ prægnantes, & quibus catamenia fiſtuntur, ut & viri ab aſthmate inveterato derepentè liberati eodem tumore tentantur) pedibus cruribúſq; ad extremum extenſis, in abdomen ruunt aquæ, & ad ultimum capacitatis ſuæ limen paulatim diſtendunt, donec tandem in viſcera nobiliora impetu ab iis facto æger ſubmergitur. Pro rata qua partes à morbo obſeſſæ mole augentur, aliæ magis magíſq; gracileſcunt, urgentibus dyſpnœâ, urinæ paucitate, & ſiti intensâ. Viros, ingraveſcente ætate; fœminas, ubi jam parere deſierint, utplurimum adoritur.

Indicationes curativæ dirigendæ ſunt primò ad aquarum evacuationem, deindè ad inſtaurandum ſanguinis robur; quò novus aquarum proventus præcaveri poſſit.

℞ *Vini albi* ℥iv, *Jalap. ſubtiliſſ. pulv.* ℥j, *Zinzib. pulv.* ℈ß, *Syr. de Spin. Cervin.* ℥j, *M. f. Potio*, ſumenda ſummo manè, repetendáq; ſingulis vel alternis diebus, pro ratione virium, donec partes affectæ detumuerint; vel,

℞ *Tamarind.* ℥ß, *fol. Senn.* ℥ij, *Rhei* ℥jß, *coq. in ſ. q. aq. ad* ℥iij, *in Colatur. diſſolv. Mannæ & Syr. Roſ. ſolut. an.* ℥j, *Syr. de Spin. cervin.* ℥ß, *Elect. è ſucc. Roſar.* ℥iij, *M. f. Potio*, ſumenda, ut ſupra; vel,

℞

℞ *Pil. ex duob.* ℈j, *Elater. gr. iij, ol. Chym. Caryophill. gutt. ij, f. Pil. N° iij,* cap. ſummo manè, repetantúrque, ut opus fuerit; vel,

℞ *Gambugii gr. xv, vin. alb. & aq. Cichor. an.* ʒjſß, *Syr. de Spin. Cervin.* ʒß, *M. f. Potio,* ſumenda ut ſupra; vel,

℞ *Cortic. interior. Sambuc. è ligno deraſi M. iij, coq. in aq. & lact. partibus æq. miſtorum* ℔ij, *ad* ℔j. Colaturæ capiat dimidiam partem manè, & alteram ſerò quotidie, donec convaleſcat. At hoc remedium, niſi in corporibus, quæ facillimè purgativis cedunt, nihil confert.

Circa uſum Catharticorum in hoc morbo hæc tria advertenda ſunt.

Primò, utrùm ægri corpus facilè an verò difficulter Catharticis cedere ſoleat, cùm in iis qui facilè purgantur *Syrup. de Spin. Cervin. ſolus ad* ʒj, exhibitus aquas ſat copiosè eliciat, in illis verò, qui difficulter purgantur, Cathartica ſupra deſcripta, ut ut valida, vix ſcopum attingant.

Secundò, Cathartica omnia, quæ ſegniùs operantur, magis officiunt quàm prosunt; quamobrem purgatio paulò fortior, & nimia, juſto debiliori eſt præferenda.

Tertiò,

Tertiò, aquæ eâ maximâ celeritate exhauriri debent quam ægri vires ferre queant; ne nimis longa inter purgationes intervalla adhibendo, aquæ denuò affatim colligantur.

Eſt autem ubi medicamenta omnia, qualiſcunq; demum generis, quæ alvum movent, prorſus omitti poſſint ac debeant; quoties enim æger conſtitutione eſt infirmiori, vel fœmina vaporibus obnoxia, aquarum evacuatio Diureticis ſolùm committenda, inter quæ ea ſunt efficaciſſima, quæ ex ſalibus Lixivialibus fiunt; ut,

℞ *Cinerum Geniſtæ* ℔j, *infundantur frigidè in vini Rhenan.* ℔iv, *liquorꝭ per filtrationem colati* ʒiij, manè, 5ª pomeridianâ & ſerò ſingulis diebus exhibeantur, uſq; dum humor evanuerit.

Aquis jam penitus evacuatis, Calefacientia & corroborantia medicamenta uſurpanda; ut,

℞ *Rad. Raphan. Ruſtican. fol. Cochl. hortenſ. abſinth. vulgar. Salv. ſummitat. Centaur. min. & Geniſtæ, infundantur in Cereviſia forti* pro potu ordinario, qui potus incipienti hydropi aliquando ſine Catharticis ſubvenit, vel ſequent. utatur;

℞ *Conſerv. Cochl. hortenſ. abſinth. Roman. an.* ʒj, *extract. Gentian. abſinth. vulgar. &*

Cen-

Centaur. min. an. ʒiij, *cum ſ. q. Syr. è cortic. citr. f. Electuarium*, de quo ſumat ad quantitatem nuc. moſchat. maj. manè, 5ª pomeridianâ, & veſperi, ſuperbibend. ʒiv, ſequentis infuſionis.

℞ *Rad. Gentian.* ʒj, *ſummitat. Geniſt. Centaur. min. & abſinth. vulgar. an. M. j, Sem. fœnicul. & Petroſelini an.* ʒij, *inciſis minutim affunde vini Rhenani* ℔iv, *ſtent ſimul in infuſione frigida*, & coletur ſolummodo tempore uſûs.

Notandum, cùm ad corroborantium uſum deventum fuerit, ægrum nullo modo eſſe purgandum, tantiſper dum ſanguinis corroborationi navetur opera.

Quod & per ſalium Lixivialium uſum omnino obſervandum, quo quidem tempore pariter corroborare convenit.

℞ *Rad. Raphan. Ruſtican.* ʒiij, *fol. Cochl. hortenſ. abſinth. vulg. ſalviæ, ſummitat. Centaur. & Geniſtæ, an. M. iij, Aurant. inciſ. N° iij. Infundantur in Congiis vj, cereviſiæ fortis non lupulatæ, int. fermentandum*; fiat pro potu ordinario.

De

De Gonorrhœa virulenta.

Corripiunt dolor genitalium inſolitus, & rotatio teſticulorum, in non recutitis macula morbilli æmula glandem occupat, ſtatim à cujus exortu liquor, ſeminis inſtar, exſtillat, qui quotidie à ſeminis colore & conſiſtentia recedens flaveſcit tandem dilutius ovi vitello; in lue virulentiore vireſcit, & aqueo humori permiſcetur ſanguine tincto. Puſtula dicta ulcus fit, aphthis infantum ſimile, indies latiùs & profundiùs depaſcens, ſuperveniente orificii callo. Verpi non glandis ulcere, ſolâ Gonorrhœâ tentantur. Mox magnus dolor in pene, quoties erigitur, quaſi manu tranſverſus fortiter conſtringeretur, noctu præcipuè urget, dum æger lecto incaleſcit. Curvatur penis à fræno contracto. Accedit ardor urinæ, inter mingendum vix perceptibilis, ſed mictu finito, per urethræ ductum acriter urens, maximè quà in glandem deſinit. Carunculæ lotii exitum quandoq; impediunt; & ſcroti dolor ac inflammatio nonnunquam ſuperveniunt.

℞ *Maſſ. Pil. Coch. maj.* ʒiij, *extract. Rudii* ʒj, *Reſin. Jalap. & Diagryd. an.* ʒß, *cum ſ. q. opobalſam. f. Pilulæ è ſingulis drachmis vj*, cap. *iv*, ſingulis Auroris, donec urinæ ardor & color flavus materiæ ſeminiform dmodum

dum imminuantur. Poſtea alternis diebus ad ſeptimanas adhuc duas; ac ſub finem bis in ſeptimana, donec humor ſtillare prorſus ceſſaverit,

In iis, qui difficulter purgantur, ſubindè intercalari poſſit potio communis purgativa, cui addantur, *Syr. è Spin. Cervin. & Elect. è ſucc. Roſar. an.* ℥ij, vel, curatione minùs fœliciter ſuccedente *Turbith Minerale ad gr. viij*, exhiberi poteſt bis vel ter, diebus quatuor interpoſitis, vel vice Turbith. mineral.

℞ *Pil. ex duob.* ℥ß, *Merc. dulc.* ℈j, *cum ſ. q. opobalſam. f. Pil. iv*, ſummo mane ſumendæ.

Si æger à dicta Catharſi abhorreat, poſt pilulas primò deſcriptas, tribus Auroris continuis ſumptas, tum manè & horâ 5ª pomeridianâ quotidie injiciatur Clyſter ſequens, niſi quòd ſemel aut bis in hebdomade, omiſſo Clyſtere, Cathartic. imperandum.

℞ *Elect. è ſucc. Roſar.* ℥vj, *Terebinth. Venet. vitello ovi ſolut.* ℥ß, *diſſolvantur in aq. hord.* ℔j, *Colaturæ adde Syrup. Violar.* ℥ij, *M. f. Clyſter.*

Singulis noctibus cap. *Opobalſam. vel Balſam. è Mecha gutt. xxv, ſacchar. fruſtulo exceptas.* Hujus defectu *Terebinthina Cypria* ad quantitatem Avellanæ ſubſtitui poſſit.

Sit

Sit pro potu hydrogala; at Cereviſia tenuis in paſtubus.

Vel ſequentem methodum aggrediatur;

℞ *Pil. ex duob.* ʒß, *Opobalſam. gutt. iij, f. Pil. N° iij.* Cap. horâ 4ª matutinâ, ſuperdormiendo, repetantúrq; alternis diebus, vel tertiâ quâq; die.

Diebus à purgatione vacuis injiciatur manè & horâ 5ª pomeridianâ Clyſter ſupra deſcriptus.

Procedente curatione (quâcunq; ea demum methodo tentetur) ſanguis ſub medium curationis ſemel vel bis mittatur, & diæta refrigerans & incraſſans præſcribatur, & medicamenta iiſdem virtutibus pollentia, qualia ſunt *hydrogala, Emulſiones ex ſeminib. frigid &c.*

Si Penis Tumore afficiatur.

℞ *Rad. Althææ, Lilior. an.* ʒjß, *fol. Malv. Verbaſc. Sambuc. Hyoſcyam. flor. Chamæmel. Melilot. an. M. j, ſem. Lini, Fœnugræc. an.* ʒß, *coq. ſ. q. aq. font. & f. fotus* parti affectæ admovendus per horæ unius ſpatium bis vel ter in die.

Peractâ fomentatione, perungatur pars affecta ol. ſem. Lin. rec. extract. dein. *Emplaſt. è mucilaginibus alutæ agninæ inductum* labiis præputii tumidis circumponatur.

Si

Si Ulcus in præputii labiis, vel in ſubjecta Glande, hæreat, tum ſequens Linimentum præſcribatur.

℞ *Unguent. Baſilic.* ℥vj, *ungeunt. Nicotian.* ℥ij, *præcipitat. aq. Roſar. loti & optimè lævigat.* ℥ß, *M. f. linimentum,* quo lintei raſura imbuatur, & ulcuſculo admoveatur ſemper poſt fotûs præſcripti uſum.

Si ſcrotum tumore afficiatur, ſtatim ſanguis è brachio extrahatur, atq; bis in die fotus præſcriptus parti affectæ admoveatur, ſingul. fotibus addendo *Sp. vin. Gallic. Cochl. j, vel alterum, vel Cataplaſma ex Oxycrato & farina fabarum* ejus loco applicandum.

Cathartici interim & refrigerantibus modò deſcriptis introſumptis utendum eſt.

De lue Venerea.

Ubi aut à Gonorrhœæ mora, aut indebito aſtringentium uſu labes ſanguini imprimitur, exoritur lues. Comparent in inguine bubones, in capite dolores & artubus, articulorum interſtitiis, noctu præcipuè invadentes in lecto calidos, cruſtulæ & porrigines in variis corporis partibus, quæ ad inſtar favi flaveſcunt. Quo magis ſcabies diffunditur, tanto minùs æger diſcruciatur. In cranio, tibiis brachiiſq; exoſtoſes, oſſium inflammatio & caries; ulcera phagædenica in variis partibus,

bus, ſed fauces ut plurimum primò aggredientia, quæ ſenſim per palatum in naſi cartilaginem propagata mox eam abſumunt, ita ut fulcro deſtitutus naſus planè concidat. Ulceribus, carie & dolore indies exacerbatis, pereunt per vices membra; lacerum donec cadaver, & jam Superis grave, humo condatur.

℞ *Axung. Porc.* ℥ij, *Mercur. crud.* ℥j, *M.f. Linimentum.* in tres æquales partes dividendum, quarum unâ brachia, crura & tibias ad tres noctes continuas manib. ſuis æger perungat.

Si intra tres dies poſt ultimam inunctionem ſalivatio haud procedat, tum *gr. viij*, *Turbith. mineral. in Conſerv. Roſar. rubr.* exhibeantur; aut corporib. minus robuſtis, *Merc. dulc.* ℈j, aut ſi ſalivatio jam incœpta priùs elangueſcat, quàm ſymptomata penitus diſparuerint, extimulanda ſubindè eſt eâdem doſi Mercur. dulc.

Ptyaliſmus ita moderari debet, ut ℔iv, Nycthemeri ſpatio expuat, aut circiter.

Si juſto altiùs exurgat Ptyaliſmus, cum inflammatione nimia, atq; id genus ſymptomatis ingruentibus, aliquantulum reprimendus eſt medicamentis Catharticis, donec debitum gradum attingat.

Quam-

Quamprimum ſymptomata ceſſaverint, ſtatim immutentur induſium & tori lintea; at ſint ea, quæ priùs uſurpata fuerint.

Si Diarrhœa ſupervenerit (quod plerunq; accidit antequam ſalivatio benè aſſurgat) tunc ſiſtenda eſt uſu Laudan. Liquid, ita dofin augendo atq; repetendo, ut debitum opus abſolvat.

Si os exulceretur, *Aq. Roſ. Damaſcen. vel lacte aq. permiſto*, vel ſeq. decoct. idem colluatur.

℞ *Rad. Althææ, Hord. mundat. an.* ℥j, *ſem. Cydonior.* ʒß, *coq. ſ. q. aq. ad* ℔ij, *M.f.* Gargariſma, quo ſæpius utatur.

Diæta & reliquum ægri regimen, eadem ac in Catharſi imperanda, niſi quòd primis aliquot diebus liquore poſſetico, juſculis avenac. hordeac. ac cereviſiâ tenui tepefactâ nutriatur.

His omnibus ritè peractis (etiamſi ſymptomata omnia evanuerint, ac ſubinde morbus penitus profligari videatur) quo minùs recidivam poſtliminiò patiatur, ægro ſemel in ſeptimana per 4 vel 6 vices, *Merc. dulc.* ℈j, exhibendus, utcunq; bene ſe habeat, & etiamſi jam domo egrediatur.

De fluore albo.

Quod effluit, modò album, modò pallidum, flavum, viride aut ſubnigrum, modò acre & erodens, tetrum quandoq; & graveolens, decoloratur facies, dolet ſpina dorſi, proſternitur appetentia, oculi pedéſq; intumeſcunt. Color colluviei linteolo exceptæ & rurſum exiccatæ humorem oſtendit.

Mittatur ſanguis è brachio ad ℥viij.

℞ *Pil. Coch. maj.* ℈ij, *Caſtor. gr. ij*, *Balſam. Peruv. gutt. iij*, *f. Pil. N° iv*, cap. horâ 4ª matutinâ, ſuperdormiendo; repetantúrq; per duas alias vices interponendo diem unum vel alterum, pro ratione virium.

℞ *Aq. Rutæ* ℥iv, *Aq. Bryon. comp.* ℥ij, *Sacchar. Cryſtall. q. ſ. f. Julapium*; Cap. Cochl. *iij*, vel *iv*, in omni languore; deinde aggrediatur uſum ſequentium.

℞ *Theriac. Andromach.* ℥jſs, *conſerv. flaved. Aurant.* ℥j, *Diaſcord.* ℥ſs, *Zinzib. condit. & nuc. moſchat. condit. an* ℥iij, *pulv. è Chel. cancr. comp.* ℈jſs, *cort. exterior. granat. Rad. Angelic. Hiſpan. Corall. rubr. præparat. & Trochiſc. de terra Lemnia an.* ℈j, *Boli Armen.* ℈ij, *Gumm. Arabic.* ℈ſs, *cum ſ. q. Syr. de Roſis ſiccis f. Electuar.* de quo ſumat ad magnitud. nuc. moſ-

moſchat. maj. manè, horâ 5ª pomeridianâ, & nocte per menſem integrum, ſuperbibendo ſequent. infuſionis Cochl. *vj.*

℞ *Rad. Emul. campan. Imperator. Angelic. Calami Aromat. an.* ℥ſſ, *fol. Abſinth. Roman. marrub. alb. centaur. min. Calamenth. vulgar. ſalviæ ſiccæ an. M. j; Bac. Junip.* ℥j, *incidantur minutim & infundantur in vini Cavarini* ℔iv, *ſtent ſimul infuſione frigidâ*, coletur tantummodò tempore uſûs.

Veſcatur cibis eupeptis, & abſtineat ab uſu olerum & fructuum qualiumcunq; & ſingul. paſtibus bibat vinum Hiſpanicum.

De Diabete.

Succi ſanguini illati per vias urinarias crudi & inconcocti exitum ſibi quærunt, unde ſenſim labefactantur vires, colliqueſcit corpus, & quaſi ſubſtantia ejus per hanc cloacam exinanitur, cum ſiti, ardore viſcerum, lumborum coxarúmq; intumeſcentiâ, & ſalivæ ſpumoſæ expuitione crebrâ.

Eadem præſcribenda ſunt, quæ in fluore albo, omiſſis ſolummodò Venæſectione & Catharſi.

De

De dolore hæmorrhoidum.

Intenſiſſimus inter excernendum dolor excruciat, & exerementi ſuperficies cruore conſpergitur: Nonnunquam tumores verrucis ſimiles in ſphincktere deliteſcunt, vel in margine ani apparent.

Mittatur ſanguis è brachio dextro ad ℥x.

℞ *Sem. Melon. Pepon. an.* ℥ß, *ſem. papav. alb.* ℥ij, *Amygd. dulc. excorticat.* N°v; *contundantur in mortario marmoreo, ſenſim affundend. Aq. Hord.* ℔ij ß, *aq. Roſar.* ℥ij, *Sacchar. albiſſ. q. s. f. s. a.* emulſio; cap. ℥iij, ſæpiuſcule.

℞ *Flor. Sulphuris, pulv. Glycyrrhiz. Sulvie an.* ℥j, *cum s. q. Balſam. Lucatel. f. Pil. è ſing.* drachm. vj; cap. iij, ter in die, ſuperbibend. Emulſ. præſcript. Cochl. vj.

℞ *Aq. Spermat. Ranar.* ℥iiij, *in qua diſſolv. Lithargyr.* ʒij, *Opii* ℈j; *f. mixtura*, cujus tantillo Linteum madefactum parti affectæ applicetur, vel ſi tumor intus lateat, Cochl. *iij*, ejuſdem mixturæ modo Clyſteris injiciantur.

Pro potu ordinario bibat aquam cum lacte coctam, vel aquam hordei; & à carnis eſu abſtineat. Singulis noctibus ſumat *Diacodium.*

De fluxu hæmorrhoidum immodico.

Innoteſcit ex viribus proſtratis, copia & diuturnitate ſanguinis excreti, fœdo corporis colore, ad citrinum (ut in ictero) vergente. Succedit cachexia, & deinde hydrops.

Eadem conferunt, quæ in fluxu menſium immodico, omiſsâ ſolummodò Catharſi.

De

De epilepſia puerorum.

Vel primo menſe aggreditur à frequentibus nimis alvi dejectionibus (quo in caſu *Diaſcordium ad quantitatem grani piperis in aq. Saxifrag. aut lacte materno ſolutum*, & exhibitum præſtantiſſimum eſt remedium). Vel circa dentitionis tempus, à ſeptimo ad decimum menſem, tuſſi comitata eſt, aut (quod multo deterius) vomitu & diarrhœâ, viridia (ut ſolent hyſtericæ) egerente infante. Quandoq; improviſò occupat paroxyſmus, os oculóſq; diſtorquens, nigredine vultum perfundens, & artus varios convellens ; quandoq; præſentitur ex digitorum in pugnum contractione, & ex ſtabili & inſolita oculorum orbitarum immobilitate. Nunc ſeriùs, nunc ocyùs ſe propipiunt paroxyſmi, certâ ſubinde periodo, vago aliàs inſultu revertentes ; ſed, appetente morte, à tergo ſe invicem premunt : Si quando inducias dent, in ſoporem proclives ſunt infantes, donec à novo reſuſcitentur inſultu.

Applicetur *Emplaſtr. Epiſpaſtic.* cervi-quam primum.

℞ *Aq. Epilept. Lang.* ʒiij, *Laudan. Liquid. gutt. j, vel ij, vel plures, pro ratione ætatis, Syr. Pæon.* ʒj; *M. f. Hauſtus,* ſumendus quam primum.

℞ *Aq. Rutæ* ʒiij, *aq. Epilept. Lang. & aq. Bryon. comp. an.* ʒj, *Syr. Caryophyll.* ʒß; *M. f. Julap.* cap. Cochl. *j,* ſingulis horis, ſi hauſtus præſcript. paroxyſmum non fugaverit.

De rachitide vera.

In rachitide adſunt partium laxitas & mollities, debilitas & languor, ignavia & torpor, & inæqualis earundem nutritio, *viz.* caput juſto majus, facies plenior & floridior, partes carnoſæ infra caput emaciantur, nodis protuberant articuli, maximè carpi, paulo minùs tali, tument & extremitates coſtarum, oſſa incurvantur,

tut, præcipuè tibiæ & fibulæ, hinc ulnæ & radii, aliquando femoris & humeri, decurvantur etiam ossa ; dentes tardè & moleſtè erumpunt, vacillant, nigreſcunt, & fruſtulatim excidunt, pectus à lateribus anguſtum, anteriùs acuminatum, abdominis repletio , & hypochondriorum tenſio, tuſſis & pulmonum vitia laceſſunt, lateralis decubitûs modò dextri, modò ſiniſtri averſatio.

℞ *Fol. Abſinth. vulgar. Centaur. minor. Marrub. alb. Chamædryos, Scordii, Calamenth. vulg. Parthen. Saxifrag. pratenſ. hyper. virg. aureæ, ſerpill. menth. ſalv. rutæ. Card. Benedict. Puleg. Abrotan. Chamæmel. Tanacet. Lilior. convall. omnium rec. collect. & inciſ. an. Mj, axung. Porcin.* ℔iiij, *ſev. ovin. & vin. Claret. an.* ℔ij, *macerentur in olla fictili ſuper cineres calidos per horas xij, deinde ebulliant ad humiditatis conſumptionem, & poſtea colentur, ut f. Linimentum*, quo venter & hypochondria illinantur manè & ſerò, ut etiam & artus hoc malo affecti, per 30 vel 40 dies, vel donec convaluerit.

℞ *Singulor. ingredient. præſcript. an. Mij*, infundantur frigidè in Cereviſiæ non Lupulat. Cong. *iiij*, pro potu.

In Tumoribus Infantum ventres occupantibus ab Evacuationibus nimiis procedentibus.

Sanguis & Viſcera herbis corroborantibus confortentur, ut in Rachitide vera; niſi quòd axillæ etiam utræq; inungantur, at non artus.

De Febribus à dentitione artis.

Sp. C. C. gutt. ij, vel iij, vel iiij, pro ratione ætatis in Cochl. *j*, vel altero aq. Ceraſor. nigr. vel Julap. alterius appropriati, exhibeantur 4ª quâq; horâ ad vices quatuor, vel ſex.

De

De febre hectica infantum.

Insigni quodam calore languent cum appetitûs dejectione, artus & truncus corporis emaciantur.

Rhabarb. inciſi ʒij *in lagenam vitream cereviſiæ tenuis* ℔ij, *capacem* immittantur pro potu ordinario.

Epoto hoc liquore, *aliæ* ℔ij, *eidem Rhabarb. ſuperaffundantur ad tertiam vicem.*

Si verò potus vi Catharticâ ſaturatiùs impregnetur, tum ℔j, epotâ alteri cereviſia mox adjiciatur.

De hæmorrhagia narium.

Dolor & calor ſinciput lancinant.

Sanguis è brachio frequenter extrahatur; victûs ratio refrigerans & incraſſans

injungatur ; Julap. refriger. & incraſſans, Cum Emulſionib. refrigerantib. præſcribantur.

Singulis diebus injiciatur *Enema refrigerans*, atq; omni nocte *Paregoric. ex Syrup. de Mecon.* exhibeatur & ſemel vel bis *potio purgativa commun.* præſcribatur.

Lintea quadruplicata immerſa aq. frigidæ, in qua ſal Prunell. diſſolvatur, & poſtea leviter expreſſa admoveantur nuchæ, & utrinq; cervici ſæpius in die.

Poſt Evacuationes liquor ſeq. applicetur.

℞ *Vitriol. Hungaric. & Alum. an.* ʒj, *Phlegmat. Vitriol.* ℥ß, *coq. tamdiu, donec omnia fuerint diſſoluta, liquorem frigefactum filtra, & à Cryſtallis ſubinde natis ſepara, liquori reſiduo adde ol. vitrioli duodecimam partem*; vel potiùs.

℞ *Aq. Plantag.* ʒiij, *bol. Armen. ſubtiliſſ. pulver.* ʒß, *probè miſceantur*; Turunda

runda ex linteo raſo liquore hoc humectata nari, ex quo ſanguis ſtillat, indatur per dies duos iſthic relinquenda.

Hoc minus ſuccedente, *Vitriol. Rom. Aq. commun. diſſolvatur, quo Turunda imbuta* nari indatur, *liquore* etiam *hoc linteamina imbuta*, & applicata, ſanguinem ſiſtunt, ſi ex parte externa diffluat.

De chloroſi.

Adſunt vultûs & totius corporis decoloratio, intumeſcentia in facie, palpebris & malleolis, gravitas totius corporis, crurum ac pedum tenſiva laſſitudo, reſpiratio difficilis, cordis palpitatio, capitis dolor, pulſus febrilis, ſomnolentia, pica & menſium ſuppreſſio.

Sumat *Pilulas Chalybeatas*, vel *pulv. Chalybeatum* in affectione hyſterica præſcript. plus minus pro ratione ætatis, ſuperbiben. hauſtum vini cujuſlibet ad libitum, vel *infuſion. corroborant. cum Rad. Angelic.* ibidem deſcriptam. Si Ægra

non valde debilis fuerit, purgetur ſemel vel bis ante præſcriptorum uſum.

De ſuppreſſione menſium.

Cibum faſtidiunt mulierculæ, fœdus faciei color eſt, gravitas totius corporis dolores ſincipitis, lumborum, crurum & imi ventris; pedum tumores infeſtant.

Eadem præſcribenda ac in Hyſterica affectione; at ſi iiſdem remediis affectus non ceſſerit, tum ſeq. ſunt præſcribenda.

Singulis Auroris, & 4ª pomeridianâ, ſumat *Julap. Hyſteric. ſine Caſtor. Cochl. v, inſtilland. Sp. C. C. gutt. xij.* Singulis noctibus ſumat cubitum itura *Trochiſc. de Myrrh.* ℈j, *cum Syr. de Artemiſ. in formam boli vel Pil. redact.*

De vomitu ſanguinis, vel etiam de hæmoptoë.

In hæmoptoë dolor & calor pectus obſident, cum debilitate quadam.

Mittatur ſanguis ex brachio dextro ad ℥x, Sequenti mane ſumat *potionem purgativ. commun.* & eâdem nocte *Paregoric. ex ʒiij, aq. Ceraſor. nigr. & Syr. de Mecon ʒj.*

Poſtea aggrediatur uſum ſequent.

℞ *Bol. Armen. ʒj, Pulv. radic. Symphyt. ʒij, Terr. Sigillat. Lapid. hæmatit. & Sang. dracon. an. ʒj, Sacchar. Albiſſ. ad pondus omnium ; M. f. Pulvis ſubtiliſſimus*, cujus cap. ʒj, manè, 5ª pomeridianâ, & nocte, ſuperbibend. ſequent. Apozemat. ℥iiij.

℞ *Fol. Plantag. Rubi Sylveſtris, & milleſol. an. M. j ; coq. ſ. q. aq. ad ℔iſſ, in Colatura diſſolv. Syrup. de Symphyt. ʒij ;*

M.

M. f. Apozema; vel cap. Cochl. *vj*, ſequent, Tincturæ.

℞ *Flor. Roſ. rubr.* ʒ*vj*, *Cort. intern. querc.* ʒ*ß*, *ſem. Plantag. parùm contuſ.* ʒ*iij*, *Aq. font.* ℔*ij*, *Sp. vitriol. q. s. ad levem aciditatem, infundantur in vaſe clauſo, calore leni, per* 4 *horas*; *Colatur. adde aq. cinnamom. hordeat.* ʒ*iij*, *Sacchar. albiſſ. q. s. ut f. Tinctura guſtui grata.*

Si ab uſu Pulveris abhorreat, utatur *Electuario* in fluxu menſium immodico præſcripto.

Enema quotidie injiciatur, & *Diacodium* horâ ſomni propinetur.

Phlebotomia inſuper ſemel, bis, vel ter (ut opus fuerit) reiteretur, diebus aliquot interpoſitis; & ſemel iterum, ſi res poſtulet, repetatur potio purgativa.

Diæta incraſſans & refrigerans obſervanda.

De punctura tendinis.

Humor aqueus, vel ichor quidam, ex orificio venæ inciſæ jugiter deſtillat.

℞ *Rad. Lilior. alb. in lacte vaccin. ad teneritud. coct. & contuſ.* ʒiiij, *farin. ſem. Lin. & Avenac. an.* ʒiij, *coq. ad cataplaſmatis conſiſtentiam in eodem lacte, quo radices coctæ fuere,* applicetur parti affectæ manè & ſerò.

De ambuſtis.

Foveatur pars affecta *linteis Sp. vin. imbutis*, uſq; dum evaneſcat dolor, ac deinceps de novo imbuatur *linteum*, quoddter vel quater in die parti affectæ applicetur.

De

De mania communi.

A nimis exaltata & vivida ſanguinis craſi oritur. Eſt & alia maniæ ſpecies febres intermittentes diuturniores excipiens, in ſtultitiam tandem degenerans, producta quidem à debilitate & vappiditate ſanguinis, à diutina fermentatione. Præſcribantur itaq; cadiaca generoſiora, *viz. Theriac. Andromach. Electuar. de ovo, Pulv. Comitiſſ. Pulv. Gualt. Rawleigh, in aq. epidem. theriacal. vel aliâ* ; & diæta inſtituatur analeptica.

In junioribus mittatur ſanguis è brachio ad ℥viij vel *ix*, bis vel ter, diebus tribus inter ſingulas Venæſectiones interpoſitis. Tum ſemel extrahatur ſanguis è venis jugularibus. Poſtea tota curatio innitatur ſequenti *Cathartico*, quod ſumat tertiâ vel 4ª quâq; die, donec convaluerit, hoc interim obſervando, quod cùm octies vel decies purgatus fuerit æger, exhibitio Cathartici ad ſeptimanam unam vel alteram omittatur.

℞

℞ *Pharmac. domeſtic.* (i. e. *rad. Bryon. alb.*) *pulv.* ʒj, lactis vaccin. ʒiiij; vel,

℞ *Ejuſdem* ʒß *vel* ʒvj, *vin. alb.* ʒiiij, *infundantur per noctem, in Colatura diſſolve Syr. Violar.* ʒj; *M. f. Potio* ʒ vel,

℞ *Gambugii gr. xiiij, aq. Ceraſor. nigr.* ʒiij, *Syr. Caryophyll.* ʒſs; *f. Potio.*

De contuſionibus.

Mittatur ſanguis è brachio lateris magis affecti ad ʒx; ſeq. mane exhibeatur *potio communis purgativ.* ac deinceps eodem modo Venæſectio & purgatio alternatim repetantur, donec æger convaluerit. Interim toto decurſu, ſi internæ partes lædantur, ſequentia præſcribantur.

℞ *Decoct. Pectoral.* ℔ſs, *Syr. Violar. cap. Ven. an.* ʒij; *f. Apozema*; cap. ℔ſs ter in die. Item *ol. Amygd. dulc. rec. Cochl.* j, ſæpius propinetur.

℞ *Ol.*

℞ *Ol. Amygd. dulc. unguent. Dialthææ & Pomat. an.* ℥j; *M. f. Linimentum*, quo inungatur pars læsa manè & serò, superimponend. fol. Brassicæ.

De furfure, sive porrigine capitis.

Potio purgans Communis bis propinetur, dein.

℞ *Ol. Amygd. Amarar. & Laurini, Cinerum fol. Abrotani an.* ℥j, *misceantur probè, & f. Linimentum*, quo inungatur totum caput singulis matutinis, diligenter infricando, & postea superimponendo vesicam suillam.

At primùm abradatur totum capillitium, & postea defricentur squammulæ sensim singulis auroris, prout decidere pronæ fuerint.

De

De morſu canis rabidi.

Poſt 40 dies aut plures melancholica adſunt ſymptomata, febris, ſitis, hydrophobia, & tandem partium extremarum convulſio.

℞ *Sp. vin. optimè rectificat.* ʒiiij, *Theriac. Andromach.* ʒj ; *f. mixtura*, quâ illinatur pars læſa ter in die, ſuperimponendo linteum eâdem mixturâ imbutum.

De ulcere veſicæ.

Pus graveolens, aut ſanguis nonnunquam ſquammulæ ſeu pelliculæ membranaceæ ac veluti furfuraceæ cruſtulæ (ſin in renibus hæreat ulcus, carunculæ minutulæ, aliquando craſſiores) unà cum urina excernuntur, perpetua dyſuria & continuus earum partium dolor infeſtant ; renibus autem affectis ulcere, dilucida dyſuriæ & doloris dantur inter-

intervalla, pus etiam excretum copiosius est, album, leve & minimè fœtidum, lacti similis profunditur urina: & longè post mictionem pus ab eo separatum in fundo residet.

℞. *Emplast. Flor. unguent. dict.* ʒjß; *f. Pil.* N° *ix*; cap. *iij* horis medicinalibus, superbibendo sequentis Aq. Coch. *vj*.

℞ *Rad. Fœnicul. Consol. Aristoloch. & Caryophyll. an.* ʒiij, *fol. Agrimon. Hyper. Bugul. Sanicul. Plantag. an. M.vj, incidantur minutim, & destillentur in vini alb. & lact. an.* ℔ *iv, & eliciantur solummodo* ℔*iv* pro usu.

℞ *Pulv. rad. Consolid. maj. & gumm. Arabic. an.* ʒj, *Sacchar. Penid.* ʒij; *f. Pulv.* cap. Cochl. *j*, bis in die.

De asthmate inveterato in iis, qui sanguineo temperamento præditi sunt.

Dividitur in tres species; Dyspnœam, quæ difficilis est respiratio, in qua crebrior densiorq; est spiritûs tractio ex infarctu pulmonum sine stertore oriunda: Asthma, ubi frequens & magna respiratio, in qua diaphragma,

diaphragma, muſculi intercoſtales, tum etiam abdominis, violenter moventur, cum ſtertore & ſibilo. In priore ſpecie ſubſtantia pulmonum, in poſteriore bronchia oppilantur: Et Orthopnœam, quæ eſt maxima ſpirandi difficultas, ſub qua ægrotantes non niſi ſedentes, & erectâ, cervice reſpirare poſſunt. Muſculi etiam pectoris & ſcapularum vehementer exagitantur.

Mittatur ſanguis è brachio dextro ad ℥x. Die ſequenti ſumat *potionem purgativam communem*, quæ repetatur tertiâ quâque die per duas alias vices.

Diebus à Purgatione vacuis ſumat ſequentia;

℞. *Sem. Aniſ. ſubtiliſſ. pulv.* ʒij, *cum* ʒ. *q. Balſam. Lucatell. f. Pil. ex ſingulis drachmis vj*; cap. *iij* manè & quintâ pomeridianâ, ſuperbibend. *decocti Amari ſine purgantib.* ℥iv calidè.

Si Symptomata adhuc maneant, repetatur de novo integer Proceſſus.

De paralyſi.

Senſus & motus in partibus quæ afficiuntur, vel ſimul, vel alterutra tantùm facultas aut prorſus extinguitur aut vitiatur.

Sumat

Sumat *Pil. Coch. min.* ʒij alternis matutinis per *vj* vices; deinde capiat ter in die per *xxx* dies *Electuar. Antiſcorbutic.* ʒij ſuperbibend. *Aqu. Antiſcorbutic. Cochl.* *vj*. Vide in ſcorbuto.

℞. *Unguent. Nervin.* ʒiij, *Sp. Lavendul. comp. & Sp. Cochl. hortenſ. an.* ʒjſs, quo inungantur partes affectæ, ut ſpina dorſi, &c. manè & ſerò.

Pleraque præſcriptorum, utut curationi ſcorbuti ſolùm deſtinari videantur; attamen cùm humores crudos ac fixos volatiliſare præ aliis apta nata ſunt, in Paralyſi etiam conveniunt.

De tuſſi & phthiſi.

Tuſſis per ſe patet. Phthiſis autem invadit ab ætatis anno 18 ad 35. Extenuatur totum corpus. Febris moleſtat hectica, à cibo invaleſcens (quæ ex celeritate pulsûs, rubedinéq; genarum dignoſcitur) materia per tuſſim excreta cruenta eſt aut purulenta, in ignem conjecta tetrum ſpirat odorem, & immiſſa in vas aquâ repletum, fundum petit. Sudores nocturni

nocturni ſuperveniunt, liveſcunt tandem genæ, facies pallat, exacuantur nares; temporum quoque collapſus, unguium incurvatio, capillorum defluxio, & alvi profluvium colliquativum, mortem ſtatim ſubſecuturam denuntiant.

Si Tuſſis recens fuerit, & nondum febrim, aut alia ſigna Peripneumoniam notham comitantia, accerſiverit, vel ſi à Pleuritide, aut Peripneumoniâ, ob neglectam ſufficientem Phlebotomiam, malè curatis eadem nequaquam orta fuerit, ſatis erit, ut æger per dies aliquot ab uſu vini & carnis abſtineat, & his ſimilibus remediis ad libitum utatur.

Balſamum ſulphuris Aniſatum ad gutt. x, Cochl. j, Sacchar. Cryſtall. inſtillatum bis vel ter in die devoretur; ut etiam Tabellar. ſequent. quas ſecum æger continuò portet, unam frequenter aſſumat.

℞. *Sacchar. Cand.* ℔ij ß, *coq. s. q. aq. font. uſque dum adhæreſcat extremis digitor. tum adde pulv. Glycyrrhizæ, Enul. Campan. ſem. Aniſ. & Angelic. an.* ʒß, *pulv. Irid. Florentin. Sulphur. an.* ʒij, *Ol. Chym. Aniſi* ♍ij; *f. s. a. Tabellæ domeſticæ vocand.* atque hoc interim Eclegmate utatur.

℞.

℞. *Ol. Amygd. dulc.* ℥ij. *Syr. Cap. Ven. Violac. an.* ℥j, *Sacchar. Cand. q. s. f. Lohoch.* de quo ſæpius lambat bacillo Glycyrrhizæ, quando tuſſis urget.

In defluxione tenui *Eclegmata incraſſantia* exhiberi poterint.

Sin verò Tuſſis his remediis haud ceſſaret (præcipuè autem ſi febrim comitem habeat, vel ſi à Peripneumonia aut Pleuritide originem ducat) tum ineptum fuerit pectoralibus fidere; ſed Venæſectione & Catharſi debellanda eſt, ut in methodo, quæ in curatione Peripneumoniæ nothæ deſcribitur.

Verùm enimvero cùm, his omnibus non obſtantibus, Tuſſis non modò non curationi ceſſerit, ſed & diuturnâ Pulmonum concuſſione eos adeò debilitaverit, ut Phthiſis tandem ſubingreſſa fuerit, tum hâc methodo procedendum.

℞. *Balſam. Peruv. gutt. x, inſtillentur Cochl. j, Syr. Hederæ terreſtris*, vel ſi id minus gratum fuerit ægro, *Cochl. j. Sacchar. Cryſtall.* cap. ter in die ſuperbibendo *Decocti Amari ſine purgantib.* ℥iv, vel (ſi idem ventrem moverit) ℥iij.

Sed

Sed omnibus aliis (quotquot adhuc inventa ſunt) *Equitatio* ad ſatis longa & diutina itinera facilè palmam præripit, hoc obſervando, ut ſi æger juvenilem ætatem prætergreſſus fuerit, plus temporis huic exercitio impendere debet, quàm ſi puer aut juvenis eſſet, & ſanè haud multò certiùs *Cortex Peruv.* febri intermittenti, quàm in hac ætate *Equitatio* Phthiſi medetur.

De ſcorbuto.

Adſunt ſpontaneæ laſſitudines, corporis gravitas, dyſpnœa, præcipuè ex motu corporis, gingivarum putrefactio, oris graveolentia, ſanguinis è naribus crebra eruptio, ambulandi difficultas, crurum nunc intumeſcentia nunc extenuatio, in iiſdem perpetuò maculæ lividæ, plumbeæ, flavæ, aut violaceæ, faciei color plerumque ex pallido fuſcus.

Extrahatur ſanguis è brachio ad ʒviij, niſi ſigna Hydropis adfuerint. Seq. mane exhibeatur *Potio Purgat. communis*, quæ repetatur tertiâ quâque die per duas alias vices.

Diebus

Diebus à purgatione vacuis, uti etiam poſtea, per menſem unum vel alterum ſumat ſequentia.

℞. *Conſerv. Cochl. hortenſ.* ℥ij, *Conſerv. Lujul.* ℥j, *pulv. Ari compoſ.* ʒvj, *cum s. q. Syr. Aurantior. f. Electuar.* de quo cap. ad magnitud. nuc. moſchat. maj manè, quintâ pomeridianâ, & nocte, ſuperbibendo *Aq. Raphan. compoſ. Cochl.* vj, vel ſequentis.

℞. *Rad. Raphan. Ruſtican. raſpat.* ℔ij, *rad. Ari* ℔j, *fol. Cochl. hort. M. xij, fol. Menth. Salv. Naſturt. aquat. & Beccabung. an. M.* vj, *ſem. Cochl. hort. paulùm contuſ.* ℔ß, *nuc. Moſchat.* ℥ß, *Vin. Alb.* ℔xij, *deſtillentur organis communib. & eliciantur ſolummodo* ℔vj, pro uſu.

Vel *Folia rec. Cochl. hortenſ. per ſe deſtillentur* pro uſu dicto.

Porrò ſequens Cerevifia ſit pro potu ordinario.

℞.

℞. *Rad. Raphan. Ruſtican. recentiſ inciſi* ʒij, *fol. Cochl. hortenſ.* N° *xij, paſſular. enucleat.* N° *vj, Aurant. cum toto inciſi dimidium, in Lagenam vitream* ℔ij, *Cereviſiæ tenuis capacem ſubere mox probè obturandam immittantur.*

In hunc modum parentur eodem tempore ſex Lagenæ pro uſu, & poſt aliquot dies ſex aliæ, antequam priores exhauriantur, & ſic deinceps; vel,

Vice hujus Cereviſiæ ſeq. mixturæ Cochl. *iij* vel *iv* immiſceri poterint ſingulis hauſtibus potûs communis.

℞. *Rad. Raphan. Ruſtican. & ſem. Cochl. hortenſ. an.* ʒß, *fol. Cochl. hortenſ. M.ij, pulpam inius Aurant. Contundantur ſimul in mortar. marm. ſenſim affundendo vin. alb.* ℔ß, *Coletur cum levi expreſſione*, & reponatur pro uſu.

Eadem remedia, Phlebotomiâ & Catharſi omiſſis, in Rheumatiſmô ſcorbutico, ſive Hyſterico, valde proſunt.

FINIS.

Libri Medici, Anatomici, Chirurgici, & Plantarum Historiæ, qui prostant Venales apud Sam. Smith & Benj. Walford, Londini. 1694.

MVSEVM BRITAN NICVM

In folio.

JOannis Raii S.R.S. Historia plantarum generalis species hactenus editas, aliasq; insuper multas noviter inventas, & descriptas complectens, accesserunt Lexicon, & nomenclator Botanicus cum Indicibus Necessariis 2 vol.

Willughbeii Ornithologia, sive historia Avium cum Iconibus elegantissimis ex recensione Joannis Raii S.R.S

----Ejusdem historiæ Piscium libri IV. cum figuris elegantissimis totum Opus recognovit Jo. Raius S.R.S.

Hippocratis & Galeni Opera Gr. Lat. conjunctim edita per Chartarium 13. tom. *Parii.*

----Opera Gr. Lat. cum Annotat. Foesii. *Genevæ.* 1615.

Bidloo Anatomia humani Corporis cum 105 fig. illust. 1685.

Diemerbroeck Opera omnia Anatom. & Med. *Ultrajecti.* 1685.

Biblio-

Bibliotheca Anatomica 2 vol. cum figuris. *Genevæ.* 1685.

Boneti (Theo.) Sepulchretum ſive Anatomia pract. 2 vol. *Gen.* 1679.

---Theſaurus medico-practicus 3 vol. *Gen.* 1692.

---Medicina Septentrionalis 2 vol. cum figuris. *Ibid.* 1685.

---Mercurius compitalitius ſive index med: pract. *Ibid.* 1683.

Dioſcoridis Opera Gr. Lat. ex interpr. J. Saraceni. *Gen.*

Lacunæ Epitome Operum Galeni. *Lugduni* 1643.

Theoph. Paracelſi Opera Omnia 2 vol. 1658.

Riverii Opera omnia Medica. *Gen.* 1679.

Zacuti Luſitani Opera 2 vol *Lugduni.* 1647.

Fabr. Hildani Opera Med-Chyrurg. cum Severino. 1682.

Sennerti Opera omnia 5 tom. in 3 vol. *Ludg.* 1666.

Aquapendente Opera Anatom. & Phyſ. cum fig. 1687.

Malphigii Opera omnia. *Londini.* 1686.

Schenkii obſervationes Med. rariores. 1665.

Pharmacopæia Collegii Reg. Londini.

---Auguſtana Aucta & renovata.

---Bruxellenſis.

Zwelferi Animad. in Pharmacop. Auguſt 2 vol.

Piſonis & Margravii Hiſt. Indiæ cum fig. 1658.

Jonſtoni Hiſt. Animalium 2 vol. cum figuris.

Charleton de differentiis Animalium. 1677,

Matthiolus in Dioſcoridem de Plantis cum fig. 1674.

Breynii Plantarum Exoticarum Centuria cum fig.

Horti Indici Malabarrici tom. xi. cum fig. 1692.

Bauhini Hiſtoria Plantarum 3 vol. cum fig.

Moriſoni plantarum hiſtoria univerſalis cum fig.

Hernandez hiſtoria plantarum, Animalium, & Mineralium Mexicanorum cum fig.

Spigelii Anatomia Corporis humani cum figuris.

Mentzelii Index Plantarum cum fig.

Rivini ordo Plantarum cum figuris. 1691.

Chabræi Stirpium Sciagraphia & Icones. 1678.

Ettmulleri Opera omnia 2 vol. 1688.

Horſtii Opera omnia Medica.

Forreſti Opera omnia 2 vol.

Fernelii Univerſa Medicina. 1680.

Lipenii Bibliotheca Medica. 1679.

Plucknetii Phytographia 2 vol. cum 800 fig. 1692.

Botannicum Anglicum, or the *Engliſh* Herbal, being a Collection of Plants, Trees, Shrubs and Herbs, with their uſes in Phyſick.

Sylvii

Sylvii (de la Boe) Opera omnia 1681.
Zeidlern Anatomia humani Corporis. 1686.

Libri Medici Quarto.

ACta Eruditorum Lipſiæ ab An. 1682. ad An. 1693.
The Philoſophical Tranſactions, publiſhed by the Royal Society, in 8 vol. which are continued from *Jan.* 1693. and publiſhed Monthly.
Miſcellanea curioſa medico-phyſica Anni xx. 1692.
Sylvii Opera Medica. *Amſt.* 1680.
Diemerbroeck Anatomia.
Tho. Williſii Opera omnia. *Amſt.* 1682.
—De Anima Brutorum 6xon.
Harderi Apiarium Obſervat. Med. 1687.
Munnick Chirurgia. 1689.
Dolæi Encyclopædia-Chyrurgica. 1689.
—Encyclopædia Medica.
Waltheri Sylva Medica opulentiſſima.
Spindleri Obſervat. Med. 1691.
Blegny Zodiacus Medico Gallicus Anni 5. 1680.
Pœchlini Obſervationes phyſ. med. cum fig. 1691.
Ang. Salæ Opera Medico-Chymica. 1682.
Swammerdam de Inſectis, cum figuris.
Caſtelli Lexicon Med. per J. Brunonem. 1682.

Ruyſchii Obſervat. Anat. Chyrurg. cum fig. 1691.
Craanen. praxis medica.
---De Homine cum fig.
Zwelferi Pharmacopeia Auguſtana.
Pauli Quadripartitum Botanicum.
Bartholini Acta Medica 5 vol. cum fig.
Borellus de motu Animalium cum fig.
Quercitani Pharmacopœia rediviva. 1679.
Wepferi Cicuta aquatica. 1679.
Caſtro de morbis mulierum.
Burneti Theſaurus Med. pract.
Joelis Opera Med.
Verney de Organo Auditus cum fig.
Charras Pharmacopœia Galen. Chym.
Bauhini pinax Theatri Botan. cum prodomo.
Cleger Specimina Medicinæ Sinicæ. 1682.
Helvighii Obſervat. Phyſ. Med.
Coberi Obſervationes Med.
Broeckhuyſen Rationes Phyſ. Med.
Cardilucis officina Sanitatis.
Hofferi Hercules Medicus.
Mauriceau de morbis mulierum pregnant.
Vander Linden de ſcriptis Medicis. 1686.
Bellinus de Urinis & Pulſibus, Febribus, &c. 1685.
Langii Opera Medica. 1688.
Jo. Michaelis Opera Medico-Chyrurg. 1688.
Peyerus de Ruminantibus cum fig.

Libri

Libri Medici 8°. & 12°.

AManni praxis Vulnerum Lethal. 1690.
Abercromby de Lue Venerea & Pulsibus.
Bartholini Anatomia cum fig.
Briggs Ophthalmographia & de Visione.
Blancardi Lexicon Med. Edit. Secunda. 1690.
---Anatomia reformata cum fig. 1688.
---Praxeos Medicæ Idea nova 1615.
---Anatomia Practica, 12°.
Bohn de Renunciatione Vulnerum. 1689.
Blasii Medicina Curatoria. 1680.
---Anatomia hominis.
Bausnerus de consensu partium.
Borelli Observat. Med.
Batanicum Monspelienſe.
Becheri physica subterranea.
Barneri Chymica Philosophica. 1689.
Bruelli praxis Med.
Burnetti Thesaurus Med. 2 vol. 12°.
Bayle opuscula Med. 12°.
Collectanea Chym. *Leidensia*. 1693.
Chesneau Observat. Med.
Car. Epistolæ Medicinales. 1691.
Charleton de Causis Catumenici.
---De Scorbuto.
---Oeconomia Animalis 12°.
Celsus de Medicina 12°. 1686.
Dickenson de quintessentia Philos. 1689.
Donker de febribus Petechialibus. 1686.

Eugalenus

Eugalenus de Scorbuto.
Franchimont. Lethotomia Med.
De Graaf Opera omnia. 1678.
Goedartius de Insectis 8°.
Grim. compend. Med. Chym. 1684.
Goeckelii concilia Medica 8°.
Goodschalke de Ossium Generat. 1691.
Glisson. opuscula Med. 3 vol. 12°.
Hippocratis Opera Gr. Lat. 2 vol. per Vander Linden.
Hoffman de Acidi & Viscidi, &c, 1689.
Harmanni praxis Chymiatrica 8°.
Hermanni Hortus. *Lugd. Bat.* 1690.
Harvæus de Motu Cordis 12°.
---De Generatione Animal. 12°.
Helmont Fundamenta Medicinæ 12°.
Jones de febribus intermittentibus.
Jonsoni Lexicon Chymicum.
Juncken praxis Med. 1689.
Lyseri Culter Anatomicus.
Love Morley de Morbo Epidem.
Lamzwerde de Motis Uteri.
Le Mort Pharmacia & Chymica.
Lister de Fontibus.
---In Goedartium de Insectis.
Lower de Corde & motu Sanguinis.
Loffii Concilia Medica.
Minficht Armament Med. Chym. 1675.
Meekren Observat. Med. Chyrurg.
Mayerne de Arthritide.
Merret pinax Britan.

Need-

Needham de formato fœtu.
Nuck Sialographia, & Adenographia. 1682.
---Operationes Chirurgicæ. 1683.
Plot de Origine fontium.
Pechlinus de purgantibus cum fig.
Pharmacopæia Leoverdienſis 12° 1692.
-----Perſica.
Walſchmidt praxis Med. 1691.
--Inſtitutiones Med. 1692.
Sculteti Armament Chyrurg. cum Apendice.
Schellancer de Auditu cum fig.
Scretas de febribus malignis.
Stalpartii Obſervat. Med, Chyr. 2 vol.
Tulpii obſervat. Med. Chyrurg.
Theatrum Chymicum 6 vol.
Vieuſſens Neurographia cum fig.
Verzaſchæ Obſervat. Medicinæ.
Le Mort Idea actionis Corporum. 1693.
Joannis Raii S.R.S. Synopſis Methodica Animalium Quadrupedum & Serpentini Generis: vulgarium notas Characteriſticas, Rariorum deſcriptiones integras exhibens: Cum Hiſtoriis & Obſervationibus Anatomicis perquam curioſis. Præmittuntur nonnulla de Animalium in Genere, Senſu, Generatione, Diviſione, &c. *Lond.* 1693. Octavo.
---Ejuſdem Synopſis Methodica Stirpium Britannicarum. 1691. Octavo.
Richardi Morton, *M.D.* Regii Collegii Medicor *Lond.* Socii, & Cenſoris, ΠΥΡΕ-

ΤΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΛΟΓΙΑ seu exercitationes de morbis universalibus âcutis. *Lond.* 1692. Oct.

---Ejusdem Phthisiologia seu exercitationes de Phthisi tribus libris comprehensæ, totumque opus variis historiis illustratum. *Lond.* 1689. Oct.

Gulielmi Cole, *M. D.* Novæ Hypotheseos ad explicanda febrium intermittentium Symptomata & typos excogitatæ Hypotyposis. Una cum Ætiologiâ remediorum; speciatim verò de Curatione per Corticem peruvianum. Accessit Dissertatiuncula de intestinorum Motu peristaltico. *Lond.* 1693. Oct.

Gualteri Harris, *M. D.* Collegii Medicor *Lond.* Socii atque Censoris tractatus de morbis acutis Infantum. *Lond.* 1689, Octavo.

Theodori de Mayerne Equit. Aurati Mag. Brit. Reg. Archiatror, comitis, Praxeos in morbis Internis præcipuè gravioribus & Chronicis Syntagma, ex adversariis, Conciliis ac Epistolis ejus summâ Cura ac diligentia concinnatum. *Lond.* 1690. Oct.

Pharmacopœia Bateana, Quâ Nongenta circiter Pharmaca è praxi Geo. Batei Regi Carolo Secundo Medici primarii excerpto ordine alphabetico concisè exhibentur. Editio altera priori multò locupletior: cum viribus ac Dosibus annexis. Item Arcana Goddardiana ex Autographo Autoris

tonis Deſumpta. Curâ Ja. Shipton. *Lond.* 1691. Duod.

Pharmacologia ſeu Manuductio ad Materiam Medicam in qua Medicamenta Officinalia, Simplicia, in Methodum Naturalem digeſta ſuccincte, & accurate deſcribuntur, cum notis generum Characteriſticis ſpecierum ſynonymis, differentiis, & Viribus, Opus Omnibus Medicis, Philoſophis, Pharmacopeis, Chirurgis & Pharmacopolis utiliſſimum à *Sam. Dale.* 1693.

Oſteologia Nova; *Or ſome New Obſervations of the Bones, and the Parts belonging to them, with the manner of their Accretion and Nutrition; communicated to the Royal Society by* Clopton Havers *M. D. in* Oct.

A Collection of Curious Travels and Voyages, in two Tomes. The firſt containing Dr. Leonart Rauwolff's *Itinerary into the Eaſtern Countreys. The ſecond taking in many parts of* Greece, Aſia Minor, Egypt, Arabia Felix, *and* Petræa, Ethiopia, &c. *From the Obſervations of Mr.* Belon, *Mr.* Vernon, *Dr.* Spon, *Dr.* Smith, *Dr.* Huntingdon, *Mr.* Greaves, Alpinus, Veſſingius, Thevenot's *Collections, and others, to which are added three Catalogues of ſuch* Trees, *Shrubs, and Herbs as grow in the* Levant. *By* John Ray, *Fellow of the Royal Society.* Lond. 1693. Octavo.

The Wiſdom of God manifeſted in the Works

of

of the Creation. viz. *The Heavenly Bodies, Elements,* &c. *Foſſils, Vegetables, Animals,* &c. *In the admirable ſtructure of the Body of Man,* &c. *By* John Ray, *Fellow of the Royal Society. The Second Edition much enlarged.* Lond. 1692.

—*His Diſcourſes concerning the Changes and Diſſolution of the World,* viz. *Of the Creation and Chaos, of the General Deluge,* &c. *Earthquakes, Conflagrations,* &c. *The Second Edition, Corrected, and very much enlarged, and illuſtrated with Copper Plates.* Lond. 1692. Oct.

Medicinal Experiments; or a Collection of choice and ſafe Remedies for the moſt part Simple and eaſily prepared; uſeful in Families, and very ſerviceable to Countrey People. By the Honourable R. Boyle, *Eſq; Fellow of the Royal Society. To which is annexed a Catalogue of his Theological and Philoſophical Books and Tracts.* Lond. 1693. *Price* 1 s.

—*A Second Volume, containing about three hundred new Receipts, publiſhed from the Author's Original Manuſcripts, and by him recommended to the Care of his Executors, and peruſed by ſome of his Learned Friends, together with a large Preface written by the Author's own hand.* Lond. 1693. *Price* 1 s. 6 d.

With moſt of the other Tracts of Mr. Boyle *in* 4° *and* 8° Latine *and* Engliſh.